

Invariants de Von Neumann des faisceaux cohérents

Philippe Eyssidieux

29 Juin 1998

Abstract

In order to study the group of L_2 holomorphic sections of the pull-back to the universal covering space of an holomorphic vector bundle on a compact complex manifold, it would be convenient to have a cohomological formalism, generalizing Atiyah's L_2 index theorem.

In [10] [11], such a formalism is proposed in a restricted context. To each coherent analytic sheaf $\mathcal{F}$ on a n -dimensional *smooth projective* variety $X^{(n)}$ and each Galois infinite unramified covering $\pi : \tilde{X} \rightarrow X$, whose Galois group is denoted by Γ , L_2 cohomology groups denoted by $H_2^q(\tilde{X}, \mathcal{F})$ are attached, such that:

1. The $H_2^q(\tilde{X}, \mathcal{F})$ underly a cohomological functor on the abelian category of coherent analytic sheaves on X .
2. If $\mathcal{F}$ is locally free, $H_2^0(\tilde{X}, \mathcal{F})$ is the group of L_2 holomorphic sections of the pull-back to $\tilde{X}$ of the holomorphic vector bundle underlying $\mathcal{F}$.
3. $H_2^q(\tilde{X}, \mathcal{F})$ belongs to a category of Γ -modules on which a dimension function $\dim_\Gamma$ with real values is defined.
4. Atiyah's L_2 index theorem holds [2]:

$$\sum_{q=0}^n (-1)^q \dim_\Gamma H_2^q(\tilde{X}, \mathcal{F}) = \sum_{q=0}^n (-1)^q \dim H_2^q(X, \mathcal{F})$$

The present work constructs such a formalism in the natural context of complex analytic spaces. Here is a sketch of the main ideas of this construction, which is more or less a Cartan-Serre version of [2].

A major ingredient will be the construction [12] of an abelian category $E_f(\Gamma)$ containing every closed Γ -submodule of the left regular representation. In topology, this device enables one to use familiar homological algebra to study L_2 Betti numbers [2] and Novikov Shubin invariants [35]. It will play a similar rôle here.

We first construct a L^p -cohomology theory ($p \in [1, \infty]$) for coherent analytic sheaves on a complex space endowed with a proper action of a group Γ such that conditions 1-2 are fulfilled. The L_p -cohomology on the Galois covering $\tilde{X} \rightarrow X$ of a coherent analytic sheaf $\mathcal{F}$ on X is the ordinary cohomology of a sheaf on X obtained by an adequate completion of the tensor product of $\mathcal{F}$ by the locally constant sheaf on X associated to the left regular representation of the discrete group $\text{Gal}(\tilde{X}/X)$ in the space of L_p functions on $\text{Gal}(\tilde{X}/X)$.

Then, we introduce an homological algebra device, montelian modules, which can be used to calculate the derived category of $E_f(\Gamma)$ and are a good model of the Čech complex calculating L_2 -cohomology

Using this we prove that $H_2^q(\tilde{X}, \mathcal{F}) \in E_f(\Gamma)$, if X is compact. This is stronger than condition 3, since this also yields Novikov-Shubin type invariants. To explain the title of the article, L_2 Betti numbers and Novikov-Shubin invariants of $H_2^q(\tilde{X}, \mathcal{F})$ are the Von Neumann invariants of the coherent analytic sheaf $\mathcal{F}$.

We also make the connection with Atiyah's L_2 -index theorem [2] thanks to a Leray-Serre spectral sequence. From this, condition 4 is easily deduced.

1 Introduction

L'étude du groupe des sections holomorphes L_2 du relevé au revêtement universel d'un fibré vectoriel holomorphe sur une variété complexe compacte serait grandement facilitée par un formalisme cohomologique¹.

Dans [10] [11], un tel formalisme est proposé. A tout faisceau cohérent $\mathcal{F}$ sur une variété complexe *projective lisse* $X^{(n)}$ de dimension n et tout revêtement galoisien non ramifié $\pi : \tilde{X} \rightarrow X$ de groupe de Galois Γ , on associe des groupes de cohomologie L_2 notés $H_2^q(\tilde{X}, \mathcal{F})$ tels que:

1. Les $H_2^q(\tilde{X}, \mathcal{F})$ s'organisant en un foncteur cohomologique sur la catégorie des faisceaux cohérents sur X .
2. Si $\mathcal{F}$ est localement libre, $H_2^0(\tilde{X}, \mathcal{F})$ s'identifie au groupe des sections holomorphes L_2 du relevé à $\tilde{X}$ du fibré sous jacent à $\mathcal{F}$.
3. Les $H_2^q(\tilde{X}, \mathcal{F})$ appartiennent à une catégorie de Γ -modules sur laquelle existe une fonction dimension $\dim_\Gamma$ à valeurs réelles.

¹Démarrée par M. Gromov [20], une série d'investigations récentes utilise cette technique pour étudier les variétés algébriques à groupe fondamental infini et est un des éléments principaux de l'idéologie de [29]. Parmi les travaux dans cette direction, citons [3], [4], [10], [28], [34], [37]

4. On a le théorème d'indice L_2 d'Atiyah [2]:

$$\sum_{q=0}^n (-1)^q \dim_{\Gamma} H_2^q(\tilde{X}, \mathcal{F}) = \sum_{q=0}^n (-1)^q \dim H_2^q(X, \mathcal{F})$$

Le présent article a pour but de construire un tel formalisme dans le cadre, naturel pour une telle étude, des espaces complexes, ce qui permet de traiter en particulier le cas des variétés algébriques singulières.

L'étude des invariants L_2 des variétés et complexes simpliciaux, nombres de Betti L_2 ([2], [6],[8],[32]) et invariants de Novikov-Shubin ([35],[36] voir aussi [22],[23],[31]) a connu récemment une simplification remarquable grâce à M.Farber [12], [13] (et indépendamment à W. Lück, [33])².

Le point principal de la contribution [12] a été de construire une catégorie abélienne $E_f(\Gamma)$ contenant tous les sous Γ -modules fermés de $L_2\Gamma$. Les nombres de Betti L_2 et invariants de Novikov-Shubin sont des invariants des objets de $E_f(\Gamma)$, ce qui permet pour les étudier des arguments similaires à ceux de la théorie de l'homologie des complexes simpliciaux. Dans [13] se trouve une preuve du théorème de Dodziuk [8] qui ressemble à la preuve faisceutique du théorème de De Rham (cf. par exemple [18]).

Ce gadget d'analyse fonctionnelle est un ingrédient majeur de notre construction.

Décrivons l'organisation de cet article.

La section 2 donne les conventions et définitions de base. Nous élargissons légèrement le contexte en autorisant que l'action de Γ sur $\tilde{X}$ ait des stabilisateurs non triviaux et en considérant des faisceaux sur lesquels agit une extension centrale de Γ par S^1 , de façon à avoir une théorie qui inclue le 'Vafa-Witten twisting trick' de [20].

La section 3 construit une théorie de la cohomologie L_p des faisceaux périodiques sur un Γ -espace complexe, pour $p \in [1, \infty]$, de telle sorte que les conditions 1-2 soient satisfaites. La cohomologie L_p du relèvement à un revêtement galoisien $\tilde{X} \rightarrow X$ d'un faisceau cohérent $\mathcal{F}$ sur X est la cohomologie ordinaire d'un faisceau sur X noté $l^p\pi_*\mathcal{F}$ et obtenu par une complétion adéquate du produit tensoriel de $\mathcal{F}$ par le faisceau localement constant sur X associé à la représentation régulière gauche du groupe discret $Gal(\tilde{X}/X)$ sur les fonctions L_p sur $Gal(\tilde{X}/X)$. Les difficultés relatives aux produit tensoriels complétés de faisceaux en espaces de Fréchet ont été contournées par une construction ad hoc. Le prix à payer pour l'évitement de cette difficulté est que nous ne savons pas à quelle sous-catégorie de la catégorie des faisceaux analytiques il est possible de prolonger le foncteur $l^p\pi_*$.

² En géométrie complexe, les nombres de Betti L_2 ont un comportement remarquable découvert par M. Gromov [19],[20] (voir aussi [1], [9], [10], [27]).

La section 4 introduit la notion de module hilbertien et décrit concrètement, en paraphrasant [12], $E_f(\Gamma)$ qui est la (plus petite) catégorie abélienne qui contient la catégorie des modules hilbertiens puis introduit un outil de calcul d'algèbre homologique, les modules montéliens, qui calculent la catégorie dérivée de $E_f(\Gamma)$ et sont un bon modèle pour le complexe de Čech qui calcule la cohomologie L_2 .

La section 5 utilise cet outil pour prouver que $H_2^q(\tilde{X}, \mathcal{F}) \in E_f(\Gamma)$, si X est compacte. Les nombres de Betti L_2 et les invariants de Novikov-Shubin de $H_2^q(\tilde{X}, \mathcal{F})$ sont les invariants de Von Neumann du faisceau analytique cohérent $\mathcal{F}$. Les invariants de Novikov-Shubin détectent le caractère non-Hausdorff de la cohomologie L_2 . Ces invariants sont pour le moment trop mal contrôlés pour envisager des applications en géométrie algébrique complexe.

La section 6 réduit la condition 4 au théorème d'indice L_2 d'Atiyah [2] grâce à une suite spectrale de Leray-Serre.

Les preuves des résultats principaux ont été obtenues en adaptant certaines idées de la preuve du théorème de l'image directe de Grauert donnée par [14] à un contexte nettement moins compliqué. Les preuves nécessitent souvent un formalisme assez lourd et la rédaction présente n'est pas optimale.

Tous ces efforts ne sauraient se justifier que par les applications. De nouvelles sont en préparation, mais de moins nouvelles [10],[11], inspirées par le livre de J.Kollàr [29], utilisent une version moins générale de la présente théorie.

Signalons aussi un travail indépendant dans une direction similaire [5].

Il paraît possible de poursuivre le travail ici entrepris de faisceautisation de la cohomologie L_2 en direction d'une théorie de Hodge mixte L_2 , peut être d'une cohomologie d'intersection L_2 pour les espaces singuliers. Ceci permet probablement d'obtenir des variantes pour des variétés singulières du travail de M. Gromov [20].

Pour leurs remarques relatives au présent travail, je dois des remerciements aux mathématiciens suivants: P. Bressler, F. Campana, J.P. Demailly, C. Simpson et J. Tapia.

2 Conventions, Notations

Le lecteur trouvera dans cette section les notations utilisées librement par la suite.

2.1 Divers

Soit E un espace de Hilbert. $\mathcal{B}(E)$ désigne l'algèbre des opérateurs bornés de E . Soient E, F deux espaces de Hilbert, $E \hat{\otimes} F$ désigne leur produit tensoriel

complété.

Soit $\mathcal{A}$ une algèbre associative. $Mod_{\mathcal{A}}$ désigne la catégorie des modules sur $\mathcal{A}$. Si X est un espace topologique $Mod_{\mathcal{A}}(X)$ désigne la catégorie des faisceaux de $\mathcal{A}$ -modules.

2.2 Algèbre homologique

Soit C une catégorie et S un système multiplicatif de morphismes. C_S désignera la catégorie localisée.

Soit B une catégorie additive. Conformément aux notations de [25], I.2, $K^i(B)$, $i = b, +, -$, désignera la catégorie dont les objets sont les complexes bornés, resp. bornés inférieurement, resp. bornés supérieurement, d'objets de la catégorie additive B et les morphismes les classes d'homotopie de morphismes de complexes. $C^i(B)$, $i = b, +, -$, désignera la catégorie dont les objets sont les complexes et les morphismes les morphismes de complexes.

$D^i(A)$ $i = b, +, -$ désignera la catégorie dérivée bornée (resp. bornée inférieurement, resp. bornée supérieurement) de la catégorie abélienne A , voir [38] [25] I.4.

Si A' est une sous catégorie localisante de A , $D_{A'}^i A$ est la catégorie dérivée à cohomologie dans A' .

La notion de δ -foncteur cohomologique utilisée ici est la notion définie en III.1, p.205 dans le livre [24] et pas celle du Lecture Notes [25]. Jusqu'à la section 5 incluse, le formalisme des catégories dérivées de J.L. Verdier n'est pas utilisé de façon essentielle.

2.3 Espaces complexes et faisceaux analytiques cohérents périodiques

Pour les fondations de la théorie des faisceaux analytiques cohérents, nous renvoyons le lecteur à [16].

Espaces complexes périodiques Soit Γ un groupe dénombrable discret.

Un Γ -*espace complexe* est un triplet $(\tilde{X}, \Gamma, \rho)$ où $\tilde{X}$ désigne un espace complexe paracompact séparé, et ρ une action proprement discontinue de Γ sur $\tilde{X}$ par biholomorphismes³.

Un *morphisme de Γ -espaces complexes* $(\tilde{X}, \Gamma, \rho) \rightarrow (\tilde{Y}, \Gamma, \rho)$ est une application holomorphe $f : \tilde{X} \rightarrow \tilde{Y}$ qui commute à l'action de Γ .

Une Γ -*variété complexe* est un Γ -espace complexe régulier.

Un Γ -espace complexe est dit *cocompact* si l'action de Γ est cocompacte.

³ Le noyau de $\Gamma \rightarrow \text{Biholo}(\tilde{X})$ peut être non trivial mais sera automatiquement fini

Un Γ -espace complexe $\tilde{X}$ sera dit Γ -*Stein* ssi il porte une fonction strictement plurisousharmonique lisse ⁴, Γ -invariante et Γ -exhaustive ⁵ et $\tilde{X} = \Gamma X^0$ où X^0 est une réunion finie de composantes connexes stabilisée par un sous groupe fini de Γ .

Faisceaux analytiques cohérents périodiques Soit $\bar{\Gamma}$ une extension centrale de Γ par un groupe compact abélien S et χ un caractère de S . Dans ce qui suit $\bar{\gamma}, \bar{g}, \dots$ désignera un élément de $\bar{\Gamma}$ dont l'image dans $\Gamma = \bar{\Gamma}/S$ sera notée $\gamma, g, \dots$

Un *faisceau analytique cohérent $\bar{\Gamma}$ -périodique* sur le Γ -espace complexe $(\tilde{X}, \Gamma, \rho)$ est un faisceau analytique cohérent $\mathcal{F}$ sur $\tilde{X}$ muni d'une action compatible de $\bar{\Gamma}$ ⁶.

Un *morphisme de faisceaux analytiques cohérents $\bar{\Gamma}$ -périodiques* est un morphisme de faisceaux analytiques cohérents qui commute à l'action de $\bar{\Gamma}$. Le noyau, le conoyau, l'image et la coimage au sens des faisceaux sur $\tilde{X}$ d'un morphisme de faisceaux périodiques héritent d'une action compatible de $\bar{\Gamma}$. La catégorie $C_{\bar{\Gamma}}(\tilde{X})$ des faisceaux analytiques cohérents $\bar{\Gamma}$ -périodiques sur un Γ -espace complexe est une catégorie abélienne.

Soit $\mathcal{F}$ un faisceau analytique cohérent $\bar{\Gamma}$ -périodique. La formule $\phi_\chi = \int_S \chi(z^{-1})i(z)dz$ définit un endomorphisme de $\mathcal{F}$ tel que $\phi_\chi i(z) = \chi(z)\phi_\chi$. Le lemme de Nakayama assure que $\mathcal{F}$ est somme directe Γ -localement finie des sous faisceaux $Im(\phi_{\chi'})$, χ' parcourant le groupe des caractères de S . Ceci ramène l'étude de $C_{\bar{\Gamma}}(\tilde{X})$ à l'étude de $C_{\bar{\Gamma}, \chi}(\tilde{X})$ qui est la sous catégorie de $C_{\bar{\Gamma}}(\tilde{X})$ dont les objets sont les faisceaux périodiques pour lesquels ϕ_χ est l'identité, i.e.: tels que S agisse sur $\mathcal{F}$ par multiplication par le caractère χ . De tels faisceaux seront dits $(\bar{\Gamma}, \chi)$ -périodiques. $C_{\bar{\Gamma}, \chi}(\tilde{X})$ est une catégorie abélienne.

On désigne par $V_{\bar{\Gamma}, \chi}(\tilde{X})$, (resp. $L_{\bar{\Gamma}, \chi}(\tilde{X})$), la sous catégorie additive (resp. la sous catégorie) de $C_{\bar{\Gamma}, \chi}(\tilde{X})$ formée des faisceaux localement libres (resp. inversibles). Ces deux catégories sont naturellement équivalentes aux catégories des fibrés vectoriels holomorphes (resp. des fibrés en droites) $(\bar{\Gamma}, \chi)$ -périodiques.

La notion d'action compatible fait sens pour des faisceaux plus généraux que les faisceaux cohérents. On désigne par $Mod_{\bar{\Gamma}, \chi}(\tilde{X})$, la catégorie des

⁴Une fonction sur un espace complexe sera dite lisse (resp. plurisousharmonique, resp. strictement plurisousharmonique), ssi elle s'exprime localement comme image réciproque par un plongement d'une fonction lisse (resp. plurisousharmonique, resp. strictement plurisousharmonique) sur $\mathbb{C}^N$.

⁵ C'est à dire telle que la fonction induite sur $\tilde{X}/\Gamma$ soit exhaustive

⁶ Par une action compatible de $\bar{\Gamma}$ on entend la donnée pour tout $\bar{\gamma} \in \bar{\Gamma}$ d'un isomorphisme $i(\bar{\gamma}) : \mathcal{F} \rightarrow \gamma^* \mathcal{F}$ tel que $i(\bar{\gamma}_1 \bar{\gamma}_2) = \gamma_2^* i(\bar{\gamma}_1) i(\bar{\gamma}_2)$ et pour tout ouvert U de $\tilde{X}$ la représentation naturelle $i : S \rightarrow Aut(\mathcal{F}(U))$ est continue pour la topologie induite par la structure d'espace de Fréchet de $\mathcal{F}(U)$.

$O_{\bar{\chi}}$ -modules munis d'une $(\bar{\Gamma}, \chi)$ -action compatible.

Une construction locale

Proposition 2.3.1 *Soit U un espace Γ -Stein. Soit U' un ouvert Γ -invariant de U tel que $\Gamma \backslash U' \subset \subset \Gamma \backslash U$.*

Soit $\mathcal{F}$ un faisceau analytique cohérent $(\bar{\Gamma}, \chi)$ -périodique défini sur U . Il existe un faisceau analytique cohérent $(\bar{\Gamma}, \chi)$ -périodique localement libre $\mathcal{V}$ défini sur U' et un morphisme surjectif, défini sur U' , $\mathcal{V} \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$.

Soit un diagramme de faisceaux analytiques cohérents $(\bar{\Gamma}, \chi)$ -périodiques sur U de la forme:

$$\begin{array}{ccccc} & & \mathcal{F} & & \\ & & \downarrow & & \\ \mathcal{W} & \rightarrow & \mathcal{G} & \rightarrow & 0 \end{array}$$

la ligne du bas étant supposée exacte. Il existe un faisceau analytique cohérent $(\bar{\Gamma}, \chi)$ -périodique localement libre noté $\mathcal{V}$, un épimorphisme $\mathcal{V} \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$ et un morphisme $\mathcal{V} \rightarrow \mathcal{W}$ (définis sur U') tels que le diagramme suivant commute:

$$\begin{array}{ccccccc} \mathcal{V} & \rightarrow & \mathcal{F} & \rightarrow & 0 & & \\ \downarrow & & \downarrow & & & & \\ \mathcal{W} & \rightarrow & \mathcal{G} & \rightarrow & 0 & & \end{array}$$

Preuve: Rappelons que $U = \Gamma U^0$ où U^0 est une composante connexe stabilisée par un sous groupe fini Σ de Γ . Nous supposons d'abord que $\chi = 0$ et que Σ est le groupe trivial. La proposition est alors une conséquence du théorème B de Cartan.

Si $\chi \neq 0$ et Σ est le groupe trivial, il est possible de construire un faisceau inversible $(\bar{\Gamma}, \chi)$ -périodique, noté L_χ . Donnons une construction. Sur l'ensemble $\bar{\Gamma} \times U^0 \times \mathbb{C}$ il y a une action L de $\bar{\Gamma}$ et une action R de S qui commutent qui se définissent par les formules $L(\bar{\gamma}).(\bar{g}, x, w) = (\bar{\gamma}\bar{g}, x, w)$ et $R(z)(\bar{g}, x, w) = (\bar{g}z^{-1}, x, \chi(z)w)$. Par suite il y a sur $W := \bar{\Gamma} \times U^0 \times \mathbb{C}/R(S)$ une action de $\bar{\Gamma}$ compatible à la projection naturelle $W \rightarrow \Gamma \times U^0 = \bar{\Gamma} \times U^0 \times \mathbb{C}/R(S)$. De plus, $W \rightarrow X$ définit un fibré en droites holomorphe sur $\Gamma \times U^0$ muni d'une $(\bar{\Gamma}, \chi)$ -action compatible. En utilisant le produit tensoriel par L_χ et son inverse, on est ramené au cas précédent.

Si $\Sigma \neq 0$, notons que nous avons une application étale Γ -invariante $\pi : V \rightarrow U$ avec $V = \Gamma \times U^0$ un Γ -espace complexe sans composante connexe fixée. Les considérations précédentes s'appliquent donc à V . On descend à U en utilisant l'épimorphisme $\pi_*\pi^*\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}$, défini pour tout faisceau abélien $\mathcal{F}$, et fonctoriel en $\mathcal{F}$.

3 Cohomologie L_p des faisceaux cohérents

Dans ce qui suit p désigne un nombre réel $\in [1, \infty[$. Pour $p = \infty$, les adaptations à fournir sont très aisées.

3.1 Construction des Images directes L^p de faisceaux cohérents périodiques dans le cas réduit

Soit $(\tilde{X}, \Gamma, \rho)$ un Γ -espace complexe réduit, $1 \rightarrow S \rightarrow \bar{\Gamma} \rightarrow \Gamma \rightarrow 1$ une extension centrale de Γ et χ un caractère de S . Notons par π l'application continue $\tilde{X} \rightarrow X = \Gamma \backslash \tilde{X}$. Convenons de noter pour toute partie P de X , $\tilde{P} := \pi^{-1}(P)$.

3.1.1 Le cas des faisceaux localement libres

Si Z est un espace complexe réduit, la topologie de la convergence uniforme sur les compacts induit une structure d'espace de Fréchet sur l'espace $O(Z)$ des fonctions holomorphes sur Z . De plus, on peut construire une classe de mesures sur Z , représentée par une mesure dv_Z dont le support est Z , et telle que, pour tout ouvert U de Z les normes $(\|\cdot\|_{L^p(K, dv_Z)})$, K parcourant les compacts de U , définissent la structure canonique d'espace de Fréchet sur $O(U)$. Si Z est une sous variété fermée de $\mathbb{C}^N$ de dimension pure d , il suffit de poser $dv_Z = i_*^{reg} \omega^d$ où $i^{reg} : Z^{reg} \rightarrow Z$ est le plongement ouvert de la partie régulière et ω est la restriction à Z^{reg} de la forme Kählerienne définie par la métrique euclidienne. Comme de plus $\tilde{X}$ est un Γ -espace complexe réduit, il est loisible de supposer $dv_{\tilde{X}}$ Γ -invariante, ce que nous ferons désormais.

Soit $\mathcal{V} \in V_{\bar{\Gamma}, \chi}(\tilde{X})$. Fixons une métrique hermitienne h , $\bar{\Gamma}$ -invariante, sur le fibré vectoriel holomorphe V associé à $\mathcal{V}$.

Définition 3.1.1 Le faisceau $l^p \pi_* \mathcal{V}$ est le faisceau en groupes abéliens sur X défini par:

$$l^p \pi_* \mathcal{V}(U) = \{s \in H^0(\pi^{-1}(U), V) : \forall K \subset\subset U \int_{\tilde{K}} |s|_h^p dv_{\tilde{X}} < \infty\}$$

Stricto sensu, la formule précédente définit un préfaisceau, mais les propriétés de recollement se vérifient aisément. Par ailleurs, il est également clair que $l^p \pi_* \mathcal{V}$ est indépendant du choix de la métrique.

$\mathcal{V} \mapsto l^p \pi_* \mathcal{V}$ est un foncteur de $V_{\bar{\Gamma}, \chi}(\tilde{X})$ vers la catégorie des faisceaux en groupes abéliens sur X .

On dispose d'une inclusion fonctorielle canonique $l^p \pi_* \mathcal{V} \xrightarrow{can(\mathcal{V})} \pi_* \mathcal{V}$.

3.1.2 Théorème d'exactitude

Soit $\mathcal{V}, \mathcal{W}$ des objets de $V_{\Gamma, X}(\tilde{X})$ et $\phi : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{W}$ un morphisme d'image le faisceau analytique cohérent périodique $\mathcal{I}$.

Soit $\tilde{U}$ un ouvert Γ -Stein de $(\tilde{X}, \Gamma, \rho)$. Soit P est une fonction strictement plurisousharmonique lisse Γ -invariante et Γ -exhaustive définie sur $\tilde{U}$. Ecrivons $\tilde{U} = \Gamma U^0$ où U^0 est une réunion finie de composantes connexes stabilisée par un sous groupe fini de Γ . Pour $\min P < t$ on définit $\tilde{U}_t = P^{-1}(]-\infty, t])$ et $U_t^0 = \tilde{U}_t \cap U^0$.

Lemme 3.1.2 *Fixons t tel que $\min P < t$. Il existe $t' > t$ et une constante réelle $C_{t,t'} > 0$, telle que pour toute section s' de $\mathcal{W}$ définie sur U^0 et localement contenue dans $\mathcal{I}$, il existe une section s de $\mathcal{V}$ sur U^0 telle que $\phi(s) = s'$ et vérifiant:*

$$\int_{U_t^0} \|s\|^p \leq C_{t,t'} \int_{U_{t'}^0} \|s'\|^p$$

Preuve : Considérons l'espace $\mathcal{W}(U^0)$ des sections holomorphes de W sur U^0 . Pour $t \in \mathbb{R}$, nous définissons une norme $\|\cdot\|_t$ sur $\mathcal{W}(U^0)$ par la formule:

$$\|\sigma\|_t^p = \int_{U_t^0} |\sigma|^p$$

Cette collection de normes induit sur $\mathcal{W}(U^0)$ une topologie d'espace de Fréchet, indépendante de p .

Lemme 3.1.3 *L'espace $\mathcal{I}(U^0) \subset \mathcal{W}(U^0)$ est un fermé.*

Preuve: Voir [16], p. 46 ⁷. La topologie induite sur $\mathcal{I}(U^0)$ est donc de Fréchet.

L'application $\phi : \mathcal{V}(U^0) \rightarrow \mathcal{W}(U^0)$ est une application linéaire continue car $\|\phi(s')\|_t \leq (\sup_{x \in U_t^0} \|\phi(x)\|) \|s'\|_t$. Elle est à valeurs dans $\mathcal{I}(U^0)$ et $\phi : \mathcal{V}(U^0) \rightarrow \mathcal{I}(U^0)$ est surjective par le Théorème B de Cartan, puisque U^0 est de Stein.

Une application continue et surjective entre espaces de Fréchet est ouverte, voir [39], p.75.

De ce fait, l'ouvert $\Omega_t = \{s \in \mathcal{I}(U^0), \int_{U_t^0} |s|^p < 1\} = B_{\|\cdot\|_t}(0, 1)$ vérifie que $\phi(\Omega_t)$ est un ouvert de $\mathcal{I}(U^0)$. Par suite $\exists t' > 0, \epsilon > 0$ tel que $\{s \in \mathcal{I}(\Delta), \int_{U_{t'}^0} |s|^p < \epsilon\}$ soit contenu dans $\phi(\Omega_t)$. On peut toujours supposer $t' > t$. Poser $C_{t,t'} = 2/\epsilon$ établit le lemme 3.1.2.

Le lemme 3.1.2 se traduit immédiatement en le:

⁷Il s'agit d'une application standard du lemme de Krull, combiné avec l'observation que la convergence L_{loc}^p force la convergence des coefficients du développement en série entière en tout point de Δ^n .

Corollaire 3.1.4 *L'image de $l^p\pi_*\phi : l^p\pi_*\mathcal{V} \rightarrow l^p\pi_*\mathcal{W}$ s'identifie sous l'inclusion naturelle $l^p\pi_*\mathcal{W} \rightarrow \pi_*\mathcal{W}$ au sous faisceau $l^p\pi_*\mathcal{W} \cap \pi_*\mathcal{I}$.*

Preuve : Puisque π est un morphisme de Stein, $\pi_*\mathcal{I}$ est l'image de $\pi_*\phi : \pi_*\mathcal{V} \rightarrow \pi_*\mathcal{W}$. Par suite, $\text{Im}(l^p\pi_*\phi) \subset l^p\pi_*\mathcal{W} \cap \pi_*\mathcal{I}$.

Prouvons la réciproque. Un élément ξ_x de $(\pi_*\mathcal{I} \cap l^p\pi_*\mathcal{W})_x$ est le germe en x d'une section de ce faisceau définie sur un ouvert de la forme $\Gamma \setminus \tilde{U}$ avec $\tilde{U}$ un ouvert Γ -Stein, c'est à dire par la donnée d'une collection $(f'_\gamma)_{\gamma \in \Gamma/\Sigma}$ de section holomorphes sur $\gamma.U^0$ vérifiant pour toute constante réelle $t > P(x)$, $\sum_\gamma \int_{\gamma U_t^0} |f'_\gamma|^p < \infty$ et $f'_\gamma \in \mathcal{I}(\gamma U^0)$.

Choisissons pour $\gamma \in \Gamma/\Sigma$ un élément $\bar{\gamma} \in \bar{\Gamma}$ qui s'envoie sur γ et posons $s'_\gamma(y) := \bar{\gamma}^{-1} f'_\gamma(\gamma y)$. s'_γ est une section de $\mathcal{W}$ sur U^0 localement contenue dans $\mathcal{I}$. La proposition 3.1.2 assure que l'on peut choisir des constantes $t' > t > P(x)$ et $C_{t,t'} > 0$ indépendantes de γ et des sections holomorphes de $\mathcal{V}$, s_γ , telles que $\phi(s_\gamma) = s'_\gamma$ et $\int_{U_t^0} |s_\gamma|^p \leq C_{t,t'} \int_{U_{t'}^0} |s'_\gamma|^p$.

Posons $f_\gamma(y) = \bar{\gamma} s(\gamma^{-1}y)$. Ceci définit une section de $\mathcal{V}$ sur γU_t^0 tel que $\phi(f_\gamma) = f'_\gamma$ vérifiant de plus $\sum_\gamma \int_{\gamma U_t^0} |f_\gamma|^p \leq C_{t,t'} \sum_\gamma \int_{\gamma U_{t'}^0} |f'_\gamma|^p$.

Par suite $f' = \{f'_\gamma\}_{\gamma \in \Gamma/\Sigma} \in l^p\pi_*\mathcal{V}(U_t)$. Soit η_x son germe en x . Par construction, $l^p\pi_*\phi(\eta_x) = \xi_x$. $\square$.

Proposition 3.1.5 *Soit $\mathcal{V} \xrightarrow{\phi} \mathcal{W} \xrightarrow{\psi} \mathcal{X}$ une suite exacte de $C_{\bar{\Gamma},\chi}(\tilde{X})$ tels que $\mathcal{V}$, $\mathcal{W}$, $\mathcal{X}$ sont localement libres. Alors $l^p\pi_*\mathcal{V} \xrightarrow{l^p\pi_*\phi} l^p\pi_*\mathcal{W} \xrightarrow{l^p\pi_*\psi} l^p\pi_*\mathcal{X}$ est également exacte.*

Preuve: En effet $\ker(l^p\pi_*\psi) = l^p\pi_*\mathcal{V} \cap \pi_*\ker(\psi)$. Comme $\ker(\psi) = \text{Im}(\phi)$ on peut appliquer le corollaire 3.1.4 pour conclure $\ker(l^p\pi_*\psi) = \text{Im}(l^p\pi_*\phi)$. $\square$

3.1.3 Images directes L^p de faisceaux cohérents périodiques

Soit $\tilde{U}$ un ouvert Γ -Stein de $\tilde{X}$ et $\mathcal{F}$ un objet de $C_{\bar{\Gamma},\chi}(\tilde{X})$.

Soit $R^\bullet \xrightarrow{i(R^\bullet)} \mathcal{F}$ une 2-présentation ⁸ par des faisceaux $(\bar{\Gamma}, \chi)$ -périodiques localement libres. On dispose de l'inclusion naturelle $l^p\pi_*R^\bullet \xrightarrow{\text{can}(R^\bullet)} \pi_*R^\bullet$ et du morphisme canonique $\pi_*R^0 \xrightarrow{\pi_*i(R^\bullet)} \pi_*\mathcal{F}$.

Notons $\Phi(R^\bullet)$ le sous faisceau de $\pi_*\mathcal{F}$ défini comme l'image du morphisme $l^p\pi_*R^0 \xrightarrow{\pi_*i(R^\bullet)\text{can}(i(R^\bullet))} \pi_*\mathcal{F}$.

⁸Soit F un objet d'une catégorie abélienne. Une *présentation* $R^\bullet : R^{-1} \xrightarrow{f} R^0 \xrightarrow{p} F \rightarrow 0$ de F est la donnée d'un isomorphisme p de F avec le conoyau de la flèche f . Une *résolution* de F est la donnée d'une suite exacte indexée par $-\mathbb{N}$ de la forme $R^\bullet : \dots \rightarrow R^{-n-1} \rightarrow R^{-n} \rightarrow \dots \rightarrow R^0 \rightarrow F \rightarrow 0$. Soit $k \in \mathbb{N}$, une *k-présentation* de F est une suite exacte de la forme $R^\bullet : R^{-k} \rightarrow R^{-k+1} \rightarrow \dots \rightarrow R^0 \rightarrow F \rightarrow 0$.

Lemme 3.1.6 *Soient $R_1^\bullet \xrightarrow{i_1} \mathcal{F}$ et $R_2^\bullet \xrightarrow{i_2} \mathcal{F}$ deux 2-présentations localement libres de $\mathcal{F}$. S'il existe un morphisme de 2-présentations $R_2^\bullet \rightarrow R_1^\bullet$ tel que chaque flèche $R_2^n \rightarrow R_1^n$ soit un épimorphisme, les deux sous faisceaux $\Phi(R_1^\bullet)$ et $\Phi(R_2^\bullet)$ de $\pi_*\mathcal{F}$ coïncident.*

Preuve: Le carré commutatif

$$\begin{array}{ccc} R_2^\bullet & \xrightarrow{i_2} & \mathcal{F}_U \\ \downarrow \phi_2^1 & & \downarrow Id \\ R_1^\bullet & \xrightarrow{i_1} & \mathcal{F}_U \end{array}$$

induit un carré commutatif:

$$\begin{array}{ccc} H^0(l^p\pi_*R_2^\bullet) & \xrightarrow{c(R_2^\bullet)} & \pi_*\mathcal{F}'_U \\ \downarrow \psi_2^1 & & \downarrow Id \\ H^0(l^p\pi_*R_1^\bullet) & \xrightarrow{c(R_1^\bullet)} & \pi_*\mathcal{F}'_U \end{array}$$

$\Phi(R_1^\bullet)$ et $\Phi(R_2^\bullet)$ sont les images respectives de $c(R_1^\bullet)$ et $c(R_2^\bullet)$.

Le complexe noyau $K^\bullet$ de ϕ_2^1 est un complexe de faisceaux cohérents localement libres. Il est acyclique en degrés $-1, 0$ par la suite exacte longue associée à la suite exacte courte associée à $0 \rightarrow K^\bullet \rightarrow R_2^\bullet \rightarrow R_1^\bullet$. Par suite $l^p\pi_*K^\bullet$ est un complexe acyclique en degrés $-1, 0$ par la proposition 3.1.5.

Toujours par la proposition 3.1.5, on a une suite exacte courte:

$$0 \rightarrow l^p\pi_*K^\bullet \rightarrow l^p\pi_*R_2^\bullet \xrightarrow{\phi_2^1} l^p\pi_*R_1^\bullet \rightarrow 0$$

La suite exacte longue associée assure que $H^0(l^p\pi_*R_2^\bullet) \xrightarrow{\psi_2^1} H^0(l^p\pi_*R_1^\bullet)$ est un isomorphisme. Par suite $\Phi(R_1^\bullet) = \Phi(R_2^\bullet)$. $\square$.

Par le premier point de la proposition 2.3.1, pour tout ouvert Γ -invariant U' , contenu dans un ouvert Γ -Stein U de X avec $\Gamma \backslash U' \subset \subset \Gamma \backslash U$ de X , la restriction de $\mathcal{F}$ à U' admet une 2-présentation (et même une résolution) localement libre périodique.

De plus, étant données deux 2-présentations localement libres sur U' un ouvert Γ -Stein, pour tout U'' ouvert Γ -invariant de U' tel que $\Gamma \backslash U'' \subset \subset \Gamma \backslash U'$, un raisonnement aisé appuyé sur le deuxième point de la proposition 2.3.1 assure l'existence d'une troisième 2-présentation localement libre périodique $R_3^\bullet$ définie sur U'' avec des morphismes de comparaison $R_1^\bullet \leftarrow R_3^\bullet \rightarrow R_2^\bullet$, chaque flèche étant une surjection.

Il est donc légitime de poser:

Définition 3.1.7 $l^p\pi_*\mathcal{F}$ est l'unique sous faisceau de $\pi_*\mathcal{F}$ tel que, $R_U^\bullet \rightarrow \mathcal{F}|_U$ désignant une 2-présentation locale localement libre périodique de $\mathcal{F}$ sur un ouvert Γ -invariant U , on ait $l^p\pi_*\mathcal{F}|_U = \Phi(R_U^\bullet)$.

Si $\phi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ est un morphisme de faisceaux cohérents périodiques sur $\tilde{X}$, le morphisme $\pi_*\phi : \pi_*\mathcal{F} \rightarrow \pi_*\mathcal{G}$ envoie $l^p\pi_*\mathcal{F}$ dans $l^p\pi_*\mathcal{G}$. Nous définissons $l^p\pi_*\phi$ comme la restriction de $\pi_*\phi$ à $l^p\pi_*\mathcal{F}$.

Proposition 3.1.8 *Le foncteur $l^p\pi_* : C_{\Gamma,\chi}(\tilde{X}) \rightarrow \text{Mod}_{\mathbb{Z}}(X)$, $\mathcal{F} \mapsto l^p\pi_*\mathcal{F}$, $\phi \mapsto l^p\pi_*\phi$ est un foncteur exact.*

Preuve : Seul reste à vérifier que le foncteur est exact. La question est locale.

Soit $R_{\mathcal{F}}^{\bullet} \rightarrow \mathcal{F}$ une résolution localement libre définie sur $\tilde{U}$ par des faisceaux périodiques. Le morphisme naturel $H^0(l^p\pi_*\mathcal{F})_{\tilde{U}} \rightarrow l^p\pi_*\mathcal{F}_U$ est un isomorphisme. En effet, le noyau de l'application naturelle $l^p\pi_*R_{\mathcal{F}}^0 \rightarrow l^p\pi_*\mathcal{F}$ coïncide avec le noyau de $l^p\pi_*R_{\mathcal{F}}^0 \rightarrow \pi_*\mathcal{F}$ qui est exactement $l^p\pi_*R_{\mathcal{F}}^0 \cap \pi_*\mathcal{K}$ où $\mathcal{K}$ est le noyau de $R_{\mathcal{F}}^0 \rightarrow \mathcal{F}$. Le corollaire 3.1.4 identifie $l^p\pi_*R_{\mathcal{F}}^0 \cap \pi_*\mathcal{K}$ avec l'image de $l^p\pi_*R_1^{\bullet}$, ce qui prouve l'isomorphisme annoncé.

Soit $\mathcal{S} : 0 \rightarrow \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'' \rightarrow 0$ une suite exacte courte dans $C_{\Gamma,\chi}(\tilde{X})$. Pour tout ouvert Γ -invariant assez petit $\tilde{U}$, utilisant 2.3.1, on peut construire une suite exacte définie sur $\tilde{U}$ de résolutions localement libres $R_{\mathcal{S}}^{\bullet} : 0 \rightarrow R_{\mathcal{F}'}^{\bullet} \rightarrow R_{\mathcal{F}}^{\bullet} \rightarrow R_{\mathcal{F}''}^{\bullet} \rightarrow 0$ induisant $\mathcal{S}$ en cohomologie.

Grâce à 3.1.5, il vient une suite exacte courte:

$$l^p\pi_*R_{\mathcal{S}}^{\bullet} : 0 \rightarrow l^p\pi_*R_{\mathcal{F}'}^{\bullet} \rightarrow l^p\pi_*R_{\mathcal{F}}^{\bullet} \rightarrow l^p\pi_*R_{\mathcal{F}''}^{\bullet} \rightarrow 0$$

Toujours grâce à 3.1.5, pour $q \neq 0$,

$$H^q(l^p\pi_*R_{\mathcal{F}'}^{\bullet}) = H^q(l^p\pi_*R_{\mathcal{F}}^{\bullet}) = H^q(l^p\pi_*R_{\mathcal{F}''}^{\bullet}) = 0$$

La suite exacte longue associée à $l^p\pi_*R_{\mathcal{S}}^{\bullet}$ se réduit à la suite exacte courte

$$0 \rightarrow H^0(l^p\pi_*R_{\mathcal{F}'}^{\bullet}) \rightarrow H^0(l^p\pi_*R_{\mathcal{F}}^{\bullet}) \rightarrow H^0(l^p\pi_*R_{\mathcal{F}''}^{\bullet}) \rightarrow 0$$

La 0-suite associée à $\mathcal{S}$, $0 \rightarrow l^p\pi_*\mathcal{F}' \rightarrow l^p\pi_*\mathcal{F} \rightarrow l^p\pi_*\mathcal{F}'' \rightarrow 0$ est naturellement isomorphe à la précédente et par suite exacte. $\square$.

3.2 Construction des images directes L^p dans le cas général

Lemme 3.2.1 *Soit $\tilde{Z}$ un Γ espace complexe, $\tilde{X}$ un Γ -espace complexe réduit et $\tilde{i} : \tilde{Z} \rightarrow \tilde{X}$ un plongement fermé Γ -équivariant. Notons i l'application $i : \Gamma \backslash \tilde{Z} \rightarrow \Gamma \backslash \tilde{X}$ induite par $\tilde{i}$. Soit $\mathcal{F} \in C_{\Gamma,\chi}(\tilde{X})$.*

1. *Le faisceau $l^p\pi_*\tilde{i}_*\mathcal{F}$ s'identifie à un faisceau de la forme $i_*S^p(i)$ où $S^p(i)$ désigne un sous faisceau de $\pi_*\mathcal{F}$.*
2. *Si Z est réduit $S^p(i) = l^p\pi_*\mathcal{F}$.*

3. Si Z n'est pas réduit, soit I le radical de O_Z et soit $(\mathcal{F}^k)_{k \in \mathbb{N}}$ la filtration I -adique de $\mathcal{F}$. $\pi_* \mathcal{F}$ admet alors la filtration $(\pi_* \mathcal{F}^k)_{k \in \mathbb{N}}$. Le sous-faisceau $S^p(i)$ de $\pi_* \mathcal{F}$ vérifie $Gr_{\pi_* \mathcal{F}}^k S^p(i) = l^p \pi_* Gr_{\mathcal{F}}^k \mathcal{F}$ ⁹.
4. $S^p(i)$ est indépendant du plongement i choisi.

Preuve: Le point 1. résulte du fait que $l^p \pi_* \tilde{i}_* \mathcal{F} \subset \pi_* \tilde{i}_* \mathcal{F} = i_* \pi_* \mathcal{F}$.

Pour le point 2., supposons d'abord $\mathcal{F}$ localement libre. Notons $\mathcal{F}_Z$ le faisceau localement libre sur Z obtenu par restriction de $\mathcal{F}$ à Z . Comme les applications $\mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{F}_Z(U \cap Z)$ sont continues, U désignant un ouvert de X , $S^p(i) \subset l^p \pi_* \mathcal{F}_Z$. L'autre inclusion $l^p \pi_* \mathcal{F}_Z \subset S^p(i)$ résulte du théorème de l'image ouverte appliqué aux morphismes surjectifs d'espaces de Fréchet de la forme $\mathcal{F}_X(U) \rightarrow \mathcal{F}_Z(U \cap Z)$, U désignant un ouvert de Stein de X . Le cas général se ramène au cas localement libre en utilisant des présentations locales localement libres.

Passons au point 3. Le faisceau $\tilde{i}_* \mathcal{F}$ admet la filtration I -adique $(\tilde{i}_* \mathcal{F}^k)_{k \in \mathbb{N}}$. La suite des gradués de cette filtration est $(Gr_{\pi_* \tilde{i}_* \mathcal{F}}^k \tilde{i}_* \mathcal{F})_{k \in \mathbb{N}}$. Il résulte de 3.1.8 que $Gr_{\pi_* \tilde{i}_* \mathcal{F}}^k i_* S^p(i) = l^p \pi_* Gr_{\pi_* \tilde{i}_* \mathcal{F}}^k \tilde{i}_* \mathcal{F}$. Ceci en conjonction avec les points 1. et 2. achève d'établir le point 3.

Soient i, j deux plongements dans un espace réduit. On peut toujours se ramener au cas où $\mathcal{F}$ est localement libre. Quitte à remplacer j par le produit $k = i \times j$, il est loisible de supposer que $i = p \circ j$ où p est holomorphe. Cette factorisation implique que $S^p(i) \subset S^p(j) \subset \pi_* \mathcal{F}$. S'il existe $N > 0$ tel que $I^N = 0$, le point 3. implique $S^p(i) = S^p(j)$. Le problème étant local, ceci établit le point 4. $\square$

Il est donc légitime de poser:

Définition 3.2.2 $l^p \pi_* \mathcal{F}$ est l'unique sous faisceau de $\pi_* \mathcal{F}$ tel que, pour tout ouvert Γ -invariant $\tilde{U}$ et tout Γ -plongement $\tilde{i}$ vers un espace complexe réduit X , on ait $l^p \pi_* \mathcal{F}|_{\tilde{U}} = S^p(i)$.

Cette construction est fonctorielle et il résulte de la proposition 3.1.8 que:

Proposition 3.2.3 Le foncteur $C_{\Gamma, X}(\tilde{X}) \rightarrow \text{Mod}_{\mathbb{Z}}(X)$, $\mathcal{F} \mapsto l^p \pi_* \mathcal{F}$ est un foncteur exact.

3.3 Cohomologie L^p d'un faisceau analytique cohérent périodique

Grâce à la proposition 3.2.3, il devient légitime de poser la:

⁹Dans cet énoncé, on voit $Gr_{\mathcal{F}}^k \mathcal{F}$ comme un faisceau analytique cohérent sur Z^{red} et en particulier comme un faisceau sous l'espace topologique sous jacent à Z .

Définition 3.3.1 Soit $\mathcal{F}$ un faisceau analytique cohérent $(\bar{\Gamma}, \chi)$ -périodique sur le Γ -espace complexe $\tilde{X}$, on appelle q -ième groupe de cohomologie L_p de $\mathcal{F}$ le groupe abélien $H_{(p)}^q(\tilde{X}, \mathcal{F}) := H^q(X, l^p \pi_* \mathcal{F})$.

Ceci définit bien sûr un foncteur. Les homomorphismes de Bockstein de la catégorie des faisceaux en groupes abéliens sur X donnent également des homomorphismes de Bockstein δ et on a la:

Proposition 3.3.2 *Le système de foncteurs $(\{H_{(p)}^q(\tilde{X}, \cdot)\}_{q \geq 0}, \delta)$ définit un δ -foncteur cohomologique de $C_{\bar{\Gamma}, \chi}(\tilde{X})$ dans la catégorie des groupes abéliens.*

4 Modules hilbertiens sur une Algèbre de Von Neumann

4.1 Algèbres de Von Neumann finies

Définition 4.1.1 On appelle algèbre de Von Neumann (en abrégé AVN) finie probabilisée un triplet $(\mathcal{A}, *, \tau)$ où $\mathcal{A}$ est une $\mathbb{C}$ -algèbre unitaire munie d'une involution $*$ antilinéaire et d'une forme linéaire trace τ vérifiant

- $\tau(a^*) = \overline{\tau(a)}$
- $\tau(ab) = \tau(ba)$, $\tau(Id) = 1$
- $\tau(a^*a) \geq 0$, $\tau(a^*a) = 0 \iff a = 0$
- $\langle \cdot, \cdot \rangle: \mathcal{A} \times \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$, $\langle a, b \rangle = \tau(ab^*)$ est un produit scalaire préhilbertien sur $\mathcal{A}$. Son complété $\mathcal{A}_2$ est un espace de Hilbert séparable et le morphisme $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{A}_2)$ induit par la multiplication à gauche a une image fermée pour la topologie forte des opérateurs¹⁰.
- Si (a_i) est une suite majorée croissante¹¹ d'éléments de $\mathcal{A}$ et $a = \sup_i(a_i)$, alors $\tau(a) = \sup_i(\tau(a_i))$.

Le $\mathcal{A}$ -module $\mathcal{A}_2$ sera appelé le *module standard* de $(\mathcal{A}, \tau)$.

Le commutant de $\mathcal{A}$ dans $\mathcal{B}(\mathcal{A}_2)$ est décrit par l'action à droite de l'algèbre opposée $\mathcal{A}^{op}$. $(\mathcal{A}^{op}, *, \tau)$ est également une AVN finie probabilisée de module standard $\mathcal{A}_2$.

¹⁰Où encore, $\mathcal{A}$ coïncide avec son bicommutant dans cette représentation

¹¹ Un élément d'une C^* -algèbre est dit positif ssi il est autoadjoint ($a = a^*$) et peut s'écrire sous la forme $a = bb^*$. C'est équivalent au fait que pour toute $*$ -représentation de l'algèbre dans un espace de Hilbert H , $\forall x \in H$ $(ax, x) \geq 0$.

4.2 Exemples d'algèbres de Von Neumann finies

4.2.1 Algèbres de Von Neumann d'un groupe discret

Soit Γ un groupe discret.

On définit une algèbre involutive à trace $(\mathbb{C}\Gamma, *, \tau)$ en posant $(\sum a_g g)^* = \sum \bar{a}_g g^{-1}$, $\tau(\sum a_g g) = a_e$.

Soit $\mathbb{C}\Gamma \xrightarrow{i} \mathcal{B}(l^2\Gamma)$ la représentation régulière gauche. Soit $W_l^*\Gamma$ la sous algèbre de $\mathcal{B}(l^2\Gamma)$ qui est l'adhérence de l'image de i pour la topologie forte des opérateurs. Si $a \in \mathbb{C}\Gamma$, $a_g = (i(a)\delta_e, \delta_g)$. De ce fait, tout $a \in W_l^*\Gamma$ se représente comme somme d'une famille sommable (pour la topologie forte des opérateurs) $a = \sum a_g i(g)$. On peut construire une trace τ sur l'algèbre $\mathcal{A} = W_l^*\Gamma$ par la formule $\tau(a) = a_e = (a\delta_e, \delta_e)$. On a $\tau(aa^*) = \sum |a_g|^2$. Par suite:

Exemple 4.2.1 $(W_l^*\Gamma, *, \tau)$ est une algèbre de Von Neumann probabilisée de module standard $l^2\Gamma$.

La même construction en partant de la représentation régulière droite fournit $W_r^*\Gamma$ qui est le commutant de $W_l^*\Gamma$.

4.2.2 Construction de $W_l^*(\bar{\Gamma}, \chi)$

La variante ici exposée de la construction précédente est une formalisation du 'Vafa-Witten twisting trick' de [20].

Soit Γ un groupe dénombrable discret. Soit S un groupe abélien compact. Soit χ un caractère de A . Soit $1 \rightarrow S \rightarrow \bar{\Gamma} \rightarrow \Gamma \rightarrow 1$ une extension centrale de Γ par S .

$\bar{\Gamma}$ est un groupe topologique localement compact qui porte une mesure de Haar $d\bar{\gamma}$ qui se trouve être biinvariante.

Considérons l'algèbre de convolution A de $\bar{\Gamma}$, i.e.: $A = C_o^0(\bar{\Gamma}, \mathbb{C})$, munie du produit de convolution:

$$f \cdot f'(\bar{g}) = \int_{\bar{\Gamma}} f(\bar{g}\bar{\gamma}^{-1}) f'(\bar{\gamma}) d\bar{\gamma}$$

et de l'antiinvolution antilineaire $f^*(\bar{g}) = \overline{f(\bar{g}^{-1})}$. A agit sur $E = L^2(\bar{\Gamma}, \mathbb{C})$ par produit de convolution à gauche.

Soit E_χ le sous espace fermé de E défini comme l'ensemble des fonctions f telles que $\forall z \in S, \forall \bar{g} \in \bar{\Gamma}$, on ait $\chi(z)f(\bar{g}z) = f(\bar{g})$. Le projecteur orthogonal sur E_χ est:

$$(p_\chi f)(\bar{g}) = \int_S \chi(z) f(\bar{g}z) dz$$

On a la relation de commutation: $\forall f \in A, \forall w \in E, f \cdot p_\chi w = p_\chi(f \cdot w)$. En effet:

$$\begin{aligned} (f \cdot p_\chi w)(\bar{g}) &= \int_{\bar{\Gamma}} \int_S f(\bar{g}\bar{\gamma}^{-1})\chi(z)w(\bar{\gamma}z)d\bar{\gamma}dz \\ (p_\chi(f \cdot w))(\bar{g}) &= \int_S \int_{\bar{\Gamma}} \chi(z')f(\bar{g}z'(\bar{\gamma}')^{-1})w(\bar{\gamma}')dz'd\bar{\gamma}' \\ &\stackrel{z=z', \bar{\gamma}=\bar{\gamma}'(z')^{-1}}{=} \int_{\bar{\Gamma}} \int_S \chi(z)f(\bar{g}zz^{-1}\bar{\gamma}^{-1})w(\bar{\gamma}z)d\bar{\gamma}dz \end{aligned}$$

D'où un morphisme d'algèbre involutive $A \rightarrow p_\chi A p_\chi \subset \mathcal{B}(E_\chi)$. On définit $W_l^*(\bar{\Gamma}, \chi)$ comme le bicommutant de $p_\chi A p_\chi$ dans $\mathcal{B}(E_\chi)$.

Posons $\tau_\chi(f) = (p_\chi f)(e)$. On a :

$$\begin{aligned} \tau_\chi(f \cdot g) &= \int_{\bar{\Gamma}} \int_S f(\bar{\gamma}^{-1})g(\bar{\gamma}z)\chi(z)dzd\bar{\gamma} \\ \tau_\chi(g \cdot f) &= \int_{\bar{\Gamma}} \int_S g((\bar{\gamma}')^{-1})f(\bar{\gamma}'z')\chi(z)dz'd\bar{\gamma}' \\ &= \int_{\bar{\Gamma}} \int_S g(z\bar{\gamma})f(\bar{\gamma}^{-1})\chi(z)dzd\bar{\gamma} \end{aligned}$$

De sorte que $\tau_\chi(f \cdot g) = \tau_\chi(g \cdot f)$ car S est central dans $\bar{\Gamma}$.

Le caractère contragrédient χ^c de χ , $\chi^c(z) = \bar{\chi}(z)$, définit un élément de E_χ et l'on a: $\tau_\chi(f) = (f \cdot \chi^c, \chi^c)$. Observons également que $f \cdot \chi^c = p_\chi f$. De là $\tau_\chi(f \cdot f^*) = \int_{\bar{\Gamma}} |p_\chi f(\bar{\gamma})|^2 d\bar{\gamma}$.

Résumons cette construction en la:

Proposition 4.2.2 $(W_l^*(\bar{\Gamma}, \chi), \tau_\chi)$ est une AVN probabilisée de module standard isomorphe à E_χ .

4.3 Modules hilbertiens sur une AVN finie probabilisée

Soit $(\mathcal{A}, *, \tau)$ une AVN finie probabilisée.

4.3.1 Modules hilbertiens projectifs

Définition 4.3.1 Un $\mathcal{A}$ -module à gauche $\mathcal{W}$ est dit hilbertien projectif s'il admet un produit scalaire hilbertien $(\cdot, \cdot)$ tel que $(ax, y) = (x, a^*y)$ et se plonge isométriquement dans le $\mathcal{A}$ -module $\mathcal{A}_2 \hat{\otimes} H$, H étant un espace de Hilbert sur lequel $\mathcal{A}$ agit trivialement. $\mathcal{W}$ est dit de type fini si H peut être pris de dimension finie. Un morphisme entre deux modules hilbertiens est une application linéaire bornée commutant aux actions respectives de $\mathcal{A}$.

4.3.2 Non-abélianité de la catégorie des modules hilbertiens projectifs

On définit trois catégories $P_f(\mathcal{A}) \subset P_{sep}(\mathcal{A}) \subset P(\mathcal{A})$ comme suit:

- Les objets de $P(\mathcal{A})$ sont exactement les $\mathcal{A}$ -modules hilbertiens.
- Les morphismes de $P(\mathcal{A})$ sont exactement les applications linéaires continues commutant à l'action de $\mathcal{A}$, ou encore avec les notations standard $Hom_{P(\mathcal{A})}(E, F) = L_{\mathcal{A}}(E, F)$.
- $P_f(\mathcal{A})$ (resp. $P_{sep}(\mathcal{A})$) est la sous catégorie pleine de $P(\mathcal{A})$ formée des objets de type fini (resp. réalisables dans $\mathcal{A}_2 \otimes H$ où H est un espace de Hilbert séparable).

$P(\mathcal{A})$ est une sous catégorie additive de la catégorie $Mod_{\mathcal{A}}$. La notion catégorique de noyau d'un $P(\mathcal{A})$ -morphisme $f : E \rightarrow F$ coïncide avec la notion usuelle de noyau. En revanche, la notion catégorique de conoyau (voir [30], ch. IV, p. 116) donne $Coker(f) = (E \rightarrow E/\overline{f(E)})$.

$P(\mathcal{A})$ n'est pas en général une catégorie abélienne: les morphismes stricts sont les morphismes d'image fermée.

4.3.3 Catégorie abélienne des modules hilbertiens

Cependant, $P(\mathcal{A})$ possède la propriété suivante:

Lemme 4.3.2 *Soit V, W deux $\mathcal{A}$ -modules hilbertiens projectifs et $\phi : V \rightarrow W$ un $\mathcal{A}$ -morphisme surjectif (au sens habituel, c'est à dire $\phi(V) = W$), alors ϕ a une section $\mathcal{A}$ -linéaire continue.*

Preuve: Fixons une métrique hilbertienne sur W compatible à $\mathcal{A}$ (rappelons que cela signifie $\forall a, x, y : (ax, y) = (x, a^*y)$, i.e.: que l'adjoint de l'opérateur multiplication à gauche par a est la multiplication à gauche par le conjugué de a). L'orthogonal du noyau de ϕ est un sous module hilbertien de V isomorphe via ϕ à W grâce au théorème de l'image ouverte.

Cette propriété, que ne partagent pas les catégories usuelles d'espaces vectoriels topologiques localement convexes, a pour conséquence le fait suivant dont l'observation est due à M.S. Farber:

Théoreme 4.3.3 [12] [15] *Les catégories $E_f(\mathcal{A}) \subset E_{sep}(\mathcal{A}) \subset E(\mathcal{A})$ définies comme suit:*

- Les objets de $E(\mathcal{A})$ sont les triplets (E_1, E_2, e) où E_1 et E_2 sont deux $\mathcal{A}$ -modules hilbertiens et e une application linéaire continue commutant à $\mathcal{A}$.

- $Hom_{E(\mathcal{A})}((E_1, F_2, e), (F_1, F_2, f))$ est l'ensemble des classes d'équivalence de paires d'applications linéaires continues commutant à $\mathcal{A}$ ($\phi_1 : E_1 \rightarrow F_1, \phi_2 : E_2 \rightarrow F_2$) telles que $\phi_2 e = f \phi_1$ sous la relation d'équivalence $(\phi_1, \phi_2) \sim (\phi'_1, \phi'_2) \Leftrightarrow \exists T \in L_{\mathcal{A}}(E_2, F_1), \phi'_2 - \phi_2 = fT$.
- $E_f(\mathcal{A})$ (resp. $E_{sep}(\mathcal{A})$) est la sous catégorie de $E(\mathcal{A})$ formée des objets (E_1, E_2, e) avec E_2 de type fini (resp. de type dénombrable).

sont des catégories abéliennes

On appellera $\mathcal{A}$ -modules hilbertiens les objets de $E(\mathcal{A})$. On notera $P_*(\Gamma) := P_*(W_l^* \Gamma)$, $E_*(\Gamma) := E_*(W_l^* \Gamma)$ et $P_*(\bar{\Gamma}, \chi) := P_*(W_l^*(\bar{\Gamma}, \chi))$, $E_*(\bar{\Gamma}, \chi) := E_*(W_l^*(\bar{\Gamma}, \chi))$.

4.3.4 Premières propriétés de $E(\mathcal{A})$

Normalisations des objets et morphismes Un objet $E = (E_1, E_2, e)$ de $E(\mathcal{A})$ sera dit *normal* si et seulement si e est injectif.

Lemme 4.3.4 [12] *Tout objet $E = (E_1, E_2, e)$ de $E(\mathcal{A})$ est isomorphe à un objet normal.*

Ce lemme résulte de la propriété d'excision [12]: soit (E_1, E_2, e) un objet de $E(\mathcal{A})$ et $E \subset E_1$ un sous module hilbertien tel que eE est un sous module fermé de E_2 . Alors $(E_1, E_2, e) \simeq (E_1/E, E_2/eE, e)$.

Un représentant ϕ d'un morphisme $\bar{\phi}$ dans $E(\mathcal{A})$, $\phi = (\phi_1, \phi_2)$, entre objets normaux, sera dit *normal* si et seulement si ϕ_1 est surjectif.

Soient $E = (E_1, E_2, e), F = (F_1, F_2, f)$ deux objets normaux de $P(\mathcal{A})$. Soit $\phi = (\phi_1, \phi_2) \in Hom_{P(\mathcal{A})}(E, F)$, alors il existe un objet normal de $P(\mathcal{A})$, noté E' , et un isomorphisme $\psi_E : E' \rightarrow E$ tels que le morphisme $\phi' = \phi \psi_E$ ait un représentant normal [12].

Noyaux, Conoyaux Soit $\bar{\phi} : E \rightarrow F$ un morphisme entre objets normaux admettant un représentant normal $\phi = (\phi_1, \phi_2)$. Soit $E' = (ker(\phi_1), ker(\phi_2), \bar{e})$. Le noyau de $\bar{\phi}$ est le morphisme $k(\phi) \in Hom_{E(\mathcal{A})}(E', E)$ suivant [12]:

$$k(\phi) = \begin{pmatrix} ker(\phi_1) & \xrightarrow{\bar{e}} & ker(\phi_2) \\ k(\phi_1) \downarrow & & k(\phi_2) \downarrow \\ E_1 & \xrightarrow{e} & E_2 \end{pmatrix}$$

Soit $\bar{\phi} : E \rightarrow F$ un morphisme entre objets normaux admettant un représentant normal $\phi = (\phi_1, \phi_2)$. Posons $C = (F_1 \oplus E_2, F_2, f + \phi_2)$. Le morphisme $c = (Id_{F_1} \oplus 0, Id_{F_2}) \in Hom_{E(\mathcal{A})}(F, C)$ est un conoyau de $\bar{\phi}$ [12].

Foncteur d'oubli $E(\mathcal{A}) \rightarrow \text{Mod}_{\mathcal{A}}$

Proposition 4.3.5 *La spécification $O((E_1, E_2, e)) = E_2/e(E_1)$ définit un foncteur covariant fidèle $O : E(\mathcal{A}) \rightarrow \text{Mod}_{\mathcal{A}}$ et réalise une équivalence de catégories entre $E(\mathcal{A})$ et une sous catégorie abélienne de $\text{Mod}_{\mathcal{A}}$.*

Preuve: Un morphisme f dans $E(\mathcal{A})$ induit clairement un morphisme $O(f_2) : E_2/e(E_1) \rightarrow F_2/f(F_1)$, car tout représentant g tel que $g_2 = fT$ vérifie $O(g_2) = 0$. Les règles de composition sont respectées et on a bien un foncteur $O : E(\mathcal{A}) \rightarrow \text{Mod}_{\mathcal{A}}$.

Le point essentiel est que $\text{Hom}_{E(\mathcal{A})}(E, F) \rightarrow \text{Hom}_{\text{Mod}_{\mathcal{A}}}(O(E), O(F))$ est injectif. Par 4.3.4, il est possible de supposer E et F normaux. Soit $g = (g_1, g_2)$ un morphisme tel que $O(g) = 0$. Il vient $g_2(E_2) \subset f(E_1)$. En particulier, puisque f est injective, on peut écrire $g_2 = fT$ où T est une application linéaire (uniquement déterminée) commutant à $\mathcal{A}$. Reste à voir que T est continue. Soit $P_n = (x_n, Tx_n)_n$ une suite de points du graphe de T convergeant vers $P = (x, y)$. Comme f est continue, $\lim_n fTx_n = fy$. Mais, $\lim_n fTx_n = \lim_n g_2x_n = g_2x = fTx$. De l'équation $fTx = fy$ on tire $y = Tx$. T est donc une application linéaire entre espaces de Banach dont le graphe est fermé, c'est à dire précisément une application linéaire continue.

Lemme 4.3.6 *Soient A, B deux objets de $E(\mathcal{A})$ et $\phi \in \text{Hom}_{E(\mathcal{A})}(A, B)$ un morphisme. Si $O(\phi)$ est un isomorphisme alors ϕ est un isomorphisme.*

Preuve : Ceci résulte du fait que tout noyau (resp. conoyau) dans $E(\mathcal{A})$ de ϕ est envoyé par le foncteur d'oubli O dans un noyau (resp. conoyau) de $O(\phi)$.

Projectifs de $E(\mathcal{A})$ Le foncteur $p : P(\mathcal{A}) \rightarrow E(\mathcal{A})$ et défini au niveau des objets par $p(E) = (0, E, 0)$ réalise $P(\mathcal{A})$ comme une sous catégorie pleine de la catégorie des objets projectifs de $E(\mathcal{A})$, équivalente à la catégorie des projectifs de $P(\mathcal{A})$ [12].

Objets de torsion Un objet de torsion T dans $E(\mathcal{A})$ est un objet tel que pour tout projectif P de $E(\mathcal{A})$, $\text{Hom}_{E(\mathcal{A})}(T, P) = 0$.

Un objet $T = (T_1, T_2, t)$ est de torsion si et seulement si tT_1 est dense dans T_2 [12].

Suite exacte canonique Le foncteur covariant interne de $E(\mathcal{A})$ défini au niveau des objets par $P((X_1, X_2, x)) = (\overline{xX_1}, X_2, i)$ (resp. $T((X_1, X_2, x)) = (X_1, \overline{xX_1}, x)$) est l'identité sur la sous catégorie pleine des objets projectifs

(resp. de torsion). On a les relations $P^2 = P$, $T^2 = T$, $PT = TP = 0$. De plus, pour tout objet X , on dispose de la suite exacte canonique:

$$0 \rightarrow T(X) \rightarrow X \rightarrow P(X) \rightarrow 0$$

4.3.5 Invariants numériques des objets de $E(\mathcal{A})$

$\mathcal{A}$ -dimension Un $\mathcal{A}$ -module hilbertien projectif de type fini W réalisé dans $\mathcal{A}_2 \otimes \mathbb{C}^n$ peut se laisser décrire par son projecteur orthogonal $p = (p_{ij}) \in M_n(\mathcal{A}^{op})$, et on pose $\dim_{\mathcal{A}}(W) = \sum_i \tau(p_{ii})$. Cette définition est indépendante de la réalisation. Cette fonction dimension se manipule comme dans l'algèbre linéaire classique, la principale différence est qu'elle peut prendre des valeurs réelles positives arbitraires:

- $\dim_{\mathcal{A}} W = 0 \iff W = 0$
- $\dim_{\mathcal{A}} \mathcal{A}_2 = 1$
- $\alpha \in Mor_{P(\mathcal{A})}(V, W) \implies \dim_{\mathcal{A}} V = \dim_{\mathcal{A}} Ker(\alpha) + \dim_{\mathcal{A}} \overline{Im(\alpha)}$
- Si (W_n) est une suite décroissante de $\mathcal{A}$ -modules hilbertiens de type fini, $\dim_{\mathcal{A}} \cap_n W_n = \lim_n \dim_{\mathcal{A}} W_n$.
- Si (W_n) est une suite croissante de sous modules d'un module hilbertien de type fini $\dim_{\mathcal{A}} \overline{\cup_n W_n} = \lim_n \dim_{\mathcal{A}} W_n$.

Nous appelons $\mathcal{A}$ -dimension d'un objet de $X \in P_f(\mathcal{A})$, le nombre réel $\dim_{\mathcal{A}} X := \dim_{\mathcal{A}} P(X)$.

Une propriété importante est que pour toute suite exacte $0 \rightarrow X' \rightarrow X \rightarrow X'' \rightarrow 0$, on a $\dim_{\mathcal{A}} X = \dim_{\mathcal{A}} X' + \dim_{\mathcal{A}} X''$.

Invariants de Novikov-Shubin Soit NS l'ensemble des germes en zéro de fonctions définies sur $\mathbb{R}^+$, croissantes, positives, nulles en 0. On appelle NS_d le quotient de NS par la relation d'équivalence dilatationnelle $\sim_d$ définie par:

$$F \sim_d G \iff \exists x_o > 0 \exists C, c > 0, \forall x \leq x_o, cF(cx) \leq G(x) \leq CF(Cx)$$

Soit $A = (A_1, A_2, a)$ un objet de $E_f(\mathcal{A})$. Fixons deux métriques hilbertiennes h_1, h_2 sur A_1, A_2 . Alors on peut construire la famille $\{E(\lambda)\}_{\lambda \geq 0}$ des projecteurs spectraux de a^*a . On a :

$$a^*a = E(0) + \int_0^{\|a\|^2} \lambda dE(\lambda)$$

On pose $F^{A, h_1, h_2}(x^2) = \dim_{\mathcal{A}} E(x) - \dim_{\mathcal{A}} E(0)$.

Il est trivial que, pour tout autre couple de métriques h'_1, h'_2 , $F^{A, h_1, h_2} \sim_d F^{A, h'_1, h'_2}$ et on peut donc définir F^A comme la classe de $\sim_d$ -équivalence de F^{A, h_1, h_2} .

Moins trivial est le fait suivant [12]: soient A et A' deux objets isomorphes de $T_f(\mathcal{A})$. Alors, $F^A = F^{A'} \in NS_d$.

L'invariant de Novikov-Shubin NS d'un objet A de $E_f(\mathcal{A})$ est $NS(A) = NS(T(A))$.

4.4 Calcul de la catégorie dérivée de $E_f(\mathcal{A})$ à l'aide des $\mathcal{A}$ -modules montéliens

4.4.1 Opérateurs $\mathcal{A}$ -compacts

Définition 4.4.1 Soient W, V deux $\mathcal{A}$ -modules hilbertiens projectifs. $\phi \in \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(V, W)$ est dit $\mathcal{A}$ -compact si et seulement si il existe $(\phi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'opérateurs convergeant vers ϕ au sens de la norme triple tels que, pour tout n , l'adhérence de l'image de ϕ_n est un sous module hilbertien projectif de type fini de W .

Si l'un des deux modules V ou W est de type fini, tout élément $\mathcal{L}_{\mathcal{A}}(V, W)$ est $\mathcal{A}$ -compact.

Si $\phi \in \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(V, W)$ est $\mathcal{A}$ -compact et surjectif, W est de type fini.

Lemme 4.4.2 Soit $\phi \in \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(V, W)$. Les assertions suivantes sont équivalentes:

1. ϕ est $\mathcal{A}$ -compact.
2. $\{E(\lambda)\}_{\lambda \geq 0}$ désignant la famille des projecteurs spectraux de $\phi^* \phi$, le projecteur $P_\epsilon = \int_\epsilon^\infty dE(\lambda)$ a pour image un module hilbertien projectif de type fini pour tout $\epsilon > 0$.
3. Pour tout $\epsilon > 0$ il existe un sous module hilbertien projectif V_ϵ de V de type fini de projecteur orthogonal p_{V_ϵ} , tel que $\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \phi p_{V_\epsilon} = \phi$.
4. Pour tout $\epsilon > 0$ il existe un sous module hilbertien projectif W_ϵ de W de type fini de projecteur orthogonal p_{W_ϵ} , tel que $\lim_{\epsilon \rightarrow 0} p_{W_\epsilon} \phi = \phi$.

Corollaire 4.4.3 Le composé (à droite ou à gauche) d'un morphisme $\mathcal{A}$ -compact avec une application $\mathcal{A}$ -linéaire continue est $\mathcal{A}$ -compact. En particulier, la restriction d'un $\mathcal{A}$ -morphisme $\mathcal{A}$ -compact à un sous module hilbertien projectif fermé de sa source est encore $\mathcal{A}$ -compact.

4.4.2 $\mathcal{A}$ -modules montéliens

Définition 4.4.4 Soit $t_0 \in \mathbb{R}_+^*$. Un $\mathcal{A}$ -module t_0 -prémontélien est une donnée de la forme $W = (\{W(t)\}_{t_0 \geq t > 0}, \{(\rho^W)_t^{t'}\}_{0 < t' \leq t \leq t_0})$ où :

- $\{W(t)\}_{t_0 \geq t > 0}$ est une famille de $\mathcal{A}$ -module hilbertien projectif indexée pour l'intervalle réel $]0, t_0]$.
- Pour tout couple de réels tels que $0 < t' \leq t \leq t_0$, $(\rho^W)_t^{t'}$ est une application $\mathcal{A}$ -linéaire continue de $W(t)$ vers $W(t')$.
- $(\rho^W)_t^t = Id_{W(t)}$.
- Si $t \geq t' \geq t'' > 0$, on a $(\rho^W)_t^{t''} = (\rho^W)_{t'}^{t''}(\rho^W)_t^{t'}$.
- $(\rho^W)_t^{t'}$ est $\mathcal{A}$ -compacte dès que $t' < t$.

Définition 4.4.5 Soient V, W deux $\mathcal{A}$ -modules t_0 -prémontéliens. Une famille de la forme $\{\phi(t)\}_{t_0 \geq t > 0}$ de $\mathcal{A}$ -applications linéaires continues $\phi(t) : V(t) \rightarrow W(t)$ est dite un morphisme de modules t_0 -prémontéliens si et seulement si $\phi(t')(\rho^V)_t^{t'} = (\rho^W)_t^{t'}\phi(t)$.

Définition 4.4.6 Un module prémontélien est un module t_0 -prémontélien pour un certain $t_0 > 0$ non spécifié.

Deux $\mathcal{A}$ -modules prémontélien W, W' sont dits G -équivalents s'il existe $t_1 > 0$ tel que si $t \leq t_1$ $W(t) = W'(t)$ et si $t' \leq t \leq t_1$, $(\rho^W)_t^{t'} = (\rho^{W'})_t^{t'}$.

Deux morphismes ϕ, ϕ' de $\mathcal{A}$ -modules prémontéliens sont dits G -équivalents si leurs sources (et leurs buts) sont G -équivalents et que pour $t > 0$ assez petit $\phi(t) = \phi'(t)$.

Définition 4.4.7 Un $\mathcal{A}$ -module montélien est une classe de G -équivalence de $\mathcal{A}$ -modules prémontéliens. Un morphisme de $\mathcal{A}$ -modules montéliens est une classe de G -équivalence de morphismes de $\mathcal{A}$ -modules prémontéliens.

La catégorie des $\mathcal{A}$ -modules montéliens est une catégorie additive où les noyaux existent (par 4.4.3).

Soit W un $\mathcal{A}$ -module prémontélien. Pour ne pas alourdir les notations, on sous-entendra désormais l'exposant W et on écrira $(\rho^W)_t^{t'} = \rho_t^{t'}$.

Pour $t > 0$ assez petit $(\{W(t')\}_{t' < t}, \rho_{t'}^{t''})$ forme un système projectif indexé par l'ensemble ordonné $(]0, t[, >)$.

Définition 4.4.8 $W_*(t) = \varprojlim_{t' < t} W(t')$

$W_*(t)$ est un $\mathcal{A}$ -module de Fréchet, dont la topologie peut être définie par une collection dénombrable de pseudonormes préhilbertiennes compatibles.

$\{\rho_t^{t'}\}$ définissent des applications $\mathcal{A}$ -linéaires continues dans les situations suivantes:

- $t \geq t', \rho_t^{t'} : W(t) \rightarrow W(t')$.
- $t \geq t', \rho_{*t}^{*t'} : W_*(t) \rightarrow W_*(t')$.
- $t \geq t', \rho_t^{*t'} : W(t) \rightarrow W_*(t')$.
- $t > t', \rho_{*t}^{t'} : W_*(t) \rightarrow W(t')$.

On a, de plus, quand les applications en question sont définies, $\rho_a^b \rho_c^a = \rho_c^b$, a, b, c étant des symboles de la forme t ou $*t$, $t \in \mathbb{R}$.

4.4.3 Qi-morphismes

Soit $(F^\bullet, d)$ un complexe de $\mathcal{A}$ -modules montéliens. Le module des cycles $Z^q(F^\bullet)$ est un module montélien, mais pas nécessairement celui des bords.

On dispose d'une famille de complexes de $\mathcal{A}$ -modules $(F_*(t), d)_{t>0}$ définie pour $t > 0$ assez petit et l'on pose:

$$\begin{aligned} Z_*^i(t, F^\bullet) &= \{z \in F_*^i(t); dz = 0\} \\ B_*^i(t, F^\bullet) &= dF_*^{i-1}(t) \\ H_*^i(t, F^\bullet) &= Z_*^i(t, F^\bullet)/B_*^i(t, F^\bullet) \end{aligned}$$

$H_*^i(t, F^\bullet)$ a une structure topologique de quotient non séparé d'espace de Fréchet dont nous ne nous soucierons pas en nous contentant de le regarder que comme un $\mathcal{A}$ -module au sens algébrique.

L'identité du complexe $F^\bullet$ induit pour $t' \leq t$ des applications $\mathcal{A}$ -linéaires $\rho_{*t}^{*t'} : H_*^i(t, F^\bullet) \rightarrow H_*^i(t', F^\bullet)$.

Tout morphisme de complexes de $\mathcal{A}$ -modules montéliens $\sigma^\bullet : F^\bullet \rightarrow G^\bullet$ induit donc des applications $\mathcal{A}$ -linéaires $(\sigma^i)_t^{t'} : H_*^i(t, F^\bullet) \rightarrow H_*^i(t', G^\bullet)$, définies par la formule $(\sigma^i)_t^{t'} = \rho_{*t}^{*t'} H^i(\sigma)_{*t}^{*t'}$.

Définition 4.4.9 $\sigma^\bullet : F^\bullet \rightarrow G^\bullet$ sera appelé un qi-morphisme d'ordre $q \in \mathbb{Z}$ si et seulement si pour tous $t' \leq t$ assez petits

- $i > q, t' \leq t \Rightarrow (\sigma^i)_t^{t'} : H_*^i(t, F^\bullet) \rightarrow H_*^i(t', G^\bullet)$ est un isomorphisme algébrique.
- $t' \leq t \Rightarrow (\sigma^q)_t^{t'} : H_*^q(t, F^\bullet) \rightarrow H_*^q(t', G^\bullet)$ est une surjection.

$\sigma^\bullet$ est dit un qi-morphisme si et seulement si c'est un qi-morphisme de tout ordre.

4.4.4 Complexes qhtf

Un complexe $L^\bullet$ de $\mathcal{A}$ -modules hilbertiens projectifs de type fini peut être vu comme un complexe de $\mathcal{A}$ -modules montéliens en posant $W^\bullet(t) = L^\bullet$ et $\rho_t^\bullet = Id$. En particulier l'identité d'un tel complexe est un qi-morphisme, puisque $H_*^i(t, L^\bullet) = O(H^i(L^\bullet))$ (cf. les notations du lemme 4.3.6).

Définition 4.4.10 Un complexe $F^\bullet$ de modules montéliens sera dit qhtf si et seulement si $Id : F^\bullet \rightarrow F^\bullet$ est un qi-morphisme.

Soit $\sigma^\bullet : F^\bullet \rightarrow G^\bullet$ un morphisme de complexes de $\mathcal{A}$ -modules montéliens. Le cône de $\sigma^\bullet$, $C^\bullet(\sigma)$ est le complexe dont les espaces de cochaines sont les $C^i(\sigma) = G^i \oplus F^{i+1}$ et les différentielles sont $\partial(g^i, f^{i+1}) = (dg^i + \sigma f^{i+1}, -df^{i+1})$. On a la suite exacte courte $0 \rightarrow G^\bullet \rightarrow C^\bullet(\sigma) \rightarrow F^\bullet[1] \rightarrow 0$ qui induit des suites exactes courtes $0 \rightarrow G_*^\bullet(t) \rightarrow C_*^\bullet(\sigma)(t) \rightarrow F_*^\bullet[1](t) \rightarrow 0$.

Lemme 4.4.11 Soit $\phi : P^\bullet \rightarrow F^\bullet$ un morphisme de complexes de $\mathcal{A}$ -modules montéliens, le complexe $P^\bullet$ étant un complexe de $\mathcal{A}$ -modules hilbertiens projectifs de type fini. ϕ est un qi-morphisme d'ordre q si et seulement si $\forall i \geq q$, $\forall t > 0$ assez petit, $H_*^i(t, C^\bullet(\phi)) = 0$.

Preuve : L'implication directe est bien connue, prouvons la réciproque. Supposons donc que $\forall t > 0$ assez petit, $H_*^i(t, C^\bullet(\phi)) = 0$. Soit $0 < t_1 \leq t_0$ assez petits. Utilisant la suite exacte longue du cône, on voit que $H_*^i(t_l, P^\bullet) \rightarrow H_*^i(t_l, L^\bullet)$ est surjectif pour $i = q$ et un isomorphisme pour $i > q$ et $l = 0, 1$. Mais, $H_*^i(t_0, P^\bullet) \rightarrow H_*^i(t_1, P^\bullet)$ est, par définition, l'identité de $O(H^i(P^\bullet))$; donc $H_*^i(t_0, P^\bullet) \rightarrow H_*^i(t_1, L^\bullet)$ est surjectif pour $i = q$ et un isomorphisme pour $i > q$. $\square$.

Plus généralement, ce lemme vaut quand $P^\bullet$ est qhtf.

Lemme 4.4.12 Soit $\sigma^\bullet : F^\bullet \rightarrow G^\bullet$ un morphisme de complexes de $\mathcal{A}$ -modules montéliens. Si $F^\bullet$ et $G^\bullet$ sont qhtf le cône $C^\bullet(\sigma)$ est également qhtf.

Preuve : Il suffit d'utiliser la suite exacte longue de cohomologie du cône et d'appliquer le lemme de cinq. $\square$.

Proposition 4.4.13 La sous catégorie pleine $K^i(\text{MontMod}_{\mathcal{A}})^{\text{qhtf}}$, $i \in \{b, -\}$, de la catégorie triangulée $K^i(\text{MontMod}_{\mathcal{A}})$ dont les objets sont les complexes qhtf est une sous catégorie triangulée.

Les qi-morphismes forment un système multiplicatif Q_i de la catégorie triangulée $K^b(\text{MontMod}_{\mathcal{A}})^{\text{qhtf}}$ (resp. de $K^-(\text{MontMod}_{\mathcal{A}})^{\text{qhtf}}$).

Preuve: Le premier point découle de 4.4.12.

Le deuxième point découle de [25], I.4, proposition 4.2; on prend comme foncteur cohomologique sur la catégorie triangulée des complexes qhtf vers la catégorie des groupes abéliens le foncteur $H : C^\bullet \mapsto \varinjlim_{t \rightarrow 0} H^0(t, C^\bullet)$ ¹².

4.4.5 Théorème de finitude

Proposition 4.4.14 *Soit $F^\bullet$ un complexe fini (resp. borné supérieurement) qhtf de $\mathcal{A}$ -modules montéliens, alors il existe un complexe fini (resp. borné supérieurement) de modules hilbertiens projectifs de type fini $P^\bullet$ et un qi-morphisme $P^\bullet \rightarrow F^\bullet$.*

De plus, pour tout complexe fini (resp. borné supérieurement) $Q^\bullet$ de modules hilbertiens projectifs de type fini et tout morphisme $\phi^\bullet : Q^\bullet \rightarrow F^\bullet$, il existe un complexe fini (resp. borné supérieurement) de modules hilbertiens projectifs de type fini $P^\bullet$, un qi-morphisme $\sigma^\bullet : P^\bullet \rightarrow F^\bullet$ et un morphisme de complexes $\psi^\bullet : Q^\bullet \rightarrow P^\bullet$ tels que $\phi^\bullet = \sigma^\bullet \phi^\bullet$.

Preuve : Prouvons d'abord la première assertion.

Le complexe trivial s'envoie sur $F^\bullet$ et donne un qi-morphisme d'ordre Q pour Q assez grand. Il suffit de donc montrer qu'à tout qi-morphisme d'ordre q , $\sigma^\bullet : L^\bullet \rightarrow F^\bullet$, $L^\bullet$ complexe de modules hilbertiens de type fini, on sait associer un nouveau complexe de modules hilbertiens de type fini $\hat{L}^\bullet$ et un qi-morphisme d'ordre $q-1$, $\hat{\sigma}^\bullet : \hat{L}^\bullet \rightarrow F^\bullet$.¹³

Soit $(L')^\bullet$ un complexe de modules hilbertiens projectifs de type fini. Soit $\sigma' : (L')^\bullet \rightarrow F^\bullet$ un qi-morphisme d'ordre q . Le complexe $L = T_{q-1}L'$ obtenu en tronquant en $q-1$ le complexe L' (ie $(T_{q-1}L')^i = L^i, i \geq q$ et $L^i = 0$ si $i < q$) donne également lieu à un qi-morphisme d'ordre q , $\sigma : L^\bullet \rightarrow F^\bullet$.

Lemme 4.4.15 *Soient $0 < t'' < t' < t$ assez petits. Alors:*

$$\rho_{t'}^{t''} Z^{q-1}(C^\bullet(\sigma))(t') \subset \rho_t^{t''} Z^{q-1}(C^\bullet(\sigma))(t) + dF^{q-2}(t'')$$

Preuve: σ vérifie $C^{q-2}(\sigma) = F^{q-2}, i > 1$.

Par le lemme 4.4.12, $C^\bullet(\sigma)$ est qhtf. Fixons donc $t_0 > 0$ assez petit de sorte que $t_1 \leq t_0 \Rightarrow H_*^q(t_0, C^\bullet(\sigma)) \rightarrow H_*^q(t_1, C^\bullet(\sigma))$ est un isomorphisme. On peut supposer $0 < t'' < t' < t < t_0$ de sorte que $Z_*^{q-1}(t', C^\bullet(\sigma)) \subset \rho_{*t_0}^{*t'} Z_*^{q-1}(t_0, C^\bullet(\sigma)) + \partial C_*^{q-2}(t')$. Puis:

$$\rho_{*t'}^{t''} Z_*^{q-1}(t', C^\bullet(\sigma)) \subset \rho_{*t_0}^{t''} Z_*^{q-1}(t_0, C^\bullet(\sigma)) + \rho_{*t'}^{t''} \partial C_*^{q-2}(t')$$

¹²Que les qi-morphismes soient exactement les morphismes qui deviennent des isomorphismes sous H résulte du fait que le système dont on prend la limite directe est un système dirigé d'isomorphismes, puisqu'on a pris le soin de se limiter aux complexes qhtf.

¹³Dans le cas d'un complexe fini, si q est assez petit assez petit ($F^i = 0, i \leq q$), et $\sigma^\bullet : L^\bullet \rightarrow F^\bullet$ est un qi-morphisme d'ordre q , le complexe $L_\infty^\bullet$ avec $L_\infty^q = L^q/Z^q(L^\bullet)$, $L_\infty^i = 0, i < q$ et $L_\infty^i = L^i, i > q$ et le morphisme $\sigma_\infty^\bullet$ induit par $\sigma^\bullet$ définissent un qi-morphisme $L_\infty^\bullet \rightarrow F^\bullet$.

L'inclusion annoncée résulte des inclusions suivantes:

- $\rho_{t'}^{t''} Z^{q-1}(C^\bullet(\sigma))(t') = \rho_{*t'}^{t''} \rho_{t'}^{*t'} Z^{q-1}(C^\bullet(\sigma))(t') \subset \rho_{*t'}^{t''} Z^{q-1}(t', C^\bullet(\sigma)).$
- $\rho_{*t_0}^{t''} Z_*^{q-1}(t_0, C^\bullet(\sigma)) = \rho_t^{t''} \rho_{*t_0}^t Z_*^{q-1}(t_0, C^\bullet(\sigma)) \subset \rho_t^{t''} Z^{q-1}(C^\bullet(\sigma))(t)$
- $\rho_{*t'}^{t''} C_*^{q-2}(t') \subset F^{q-2}(t'').$

Lemme 4.4.16 *Soient $0 < t'' < t' < t$ assez petits. Il existe deux morphismes de modules hilbertiens projectifs $S_{t'}^t : Z^{q-1}(C^\bullet(\sigma))(t') \rightarrow Z^{q-1}(C^\bullet(\sigma))(t)$ et $F_{t'}^{t''} : Z^{q-1}(C^\bullet(\sigma))(t') \rightarrow F^{q-2}(t'')$ tels que:*

$$\rho_{t'}^{t''} |_{Z^{q-1}(C^\bullet(\sigma))(t')} = \rho_{t'}^{t''} \rho_t^{t'} S_{t'}^t + dF_{t'}^{t''}$$

Preuve :

On pose $Z_{t',t''} = Z^{q-1}(C^\bullet(\sigma))(t') / \ker(\rho_{t'}^{t''})$.

On note $r_{t'}^{t''} : Z_{t',t''} \rightarrow Z^{q-1}(C^\bullet(\sigma))(t'')$ l'application induite par $\rho_{t'}^{t''}$.

On note $p : Z^{q-1}(C^\bullet(\sigma))(t') \rightarrow Z_{t',t''}$ l'application de passage au quotient.

$r_{t'}^{t''}$ est injective et $r_{t'}^{t''} p = \rho_{t'}^{t''}$.

L'image $I_{t',t''}$ de $\rho_{t'}^{t''}$ est la même que celle de $r_{t'}^{t''}$. $r_{t'}^{t''} : Z_{t',t''} \rightarrow I_{t',t''}$ possède un inverse $(r_{t'}^{t''})^{-1} : I_{t',t''} \rightarrow Z_{t',t''}$ qui est une application $\mathcal{A}$ -linéaire bien définie, en général non continue. Posons:

$$C' = \{(\zeta, f) \in Z^{q-1}(C^\bullet(\sigma))(t) \oplus F^{q-2}(t''), \text{ tels que } \rho_t^{t''} \zeta + df \in \rho_{t'}^{t''} Z^{q-1}(t', C^\bullet(\sigma))\}$$

Sur ce $\mathcal{A}$ -module, la norme préhilbertienne

$$\|(\zeta, f)\|_{C'}^2 = \|\zeta\|_t^2 + \|f\|_{t''}^2 + \|(r_{t'}^{t''})^{-1}(\rho_t^{t''} \zeta + df)\|_{t'}^2$$

est complète et compatible à $\mathcal{A}$.

L'inclusion naturelle isométrique $C' \rightarrow Z^{q-1}(C^\bullet(\sigma))(t) \oplus F^{q-2}(t'') \oplus Z_{t',t''}$ montre que c'est un $\mathcal{A}$ -module hilbertien.

Grâce au lemme 4.4.15, il vient:

$$r_{t'}^{t''} Z_{t',t''} \subset \rho_t^{t''} Z^{q-1}(t, C^\bullet(\sigma)) + dF^{q-2}(t'')$$

L'application $C' \rightarrow Z_{t',t''}$, $(\xi, f) \mapsto (r_{t'}^{t''})^{-1}(\rho_t^{t''} \zeta + df)$ est une contraction surjective. Elle possède une section dont les composées à gauche respectives $\Sigma_{t'}^t$, $\Phi_{t'}^{t''}$ avec les deux applications continues $C' \rightarrow Z^{q-1}(C^\bullet(\sigma))(t)$ et $C' \rightarrow F^{q-2}(t'')$ vérifient $r_{t'}^{t''} = \rho_t^{t''} \Sigma_{t'}^t + d\Phi_{t'}^{t''}$.

Les deux applications $\mathcal{A}$ -linéaires continues $S_{t'}^t = \Sigma_{t'}^t p$, $F_{t'}^{t''} = \Phi_{t'}^{t''} p$ vérifient les conditions requises.

Lemme 4.4.17 Soient $0 < t'' < t' < t$ assez petits. Il existe un module hilbertien de type fini M , trois morphismes de modules montéliens $\mu : Z^{q-1}(C^\bullet(\sigma))(t') \rightarrow M$, $\omega : M \rightarrow Z^{q-1}(C^\bullet(\sigma))(t')$ et $\tilde{F}_{t'}^{t''} : Z^{q-1}(C^\bullet(\sigma))(t') \rightarrow F^{q-2}(t'')$ tels que:

$$\rho_{t'}^{t''}|_{Z^{q-1}(t', C^\bullet(\sigma))} = \rho_{t'}^{t''} \omega \mu + d\tilde{F}_{t'}^{t''}$$

Preuve: Le morphisme $\rho_t^{t'}$ est $\mathcal{A}$ -compact. Par 4.4.3, il en va ainsi de $c = \rho_t^{t'} S_{t'}^{t'}$ qui est un endomorphisme du module hilbertien $Z^{q-1}(C^\bullet(\sigma))(t')$. Les points 3 et 4 du lemme 4.4.2 permettent de trouver un module hilbertien de type fini M , $\omega : M \rightarrow Z^{q-1}(C^\bullet(\sigma))(t')$ et $\tilde{\mu} : Z^{q-1}(C^\bullet(\sigma))(t') \rightarrow M$ deux morphismes tels que $c = \omega \tilde{\mu} + \delta$ où $\|\delta\|$ est un endomorphisme de norme triple strictement inférieure à 1. Soit $u = \sum_0^{+\infty} \delta^n$ l'inverse de $1 - \delta$.

De l'équation $\rho_{t'}^{t''} = \rho_{t'}^{t''} c + dF_{t'}^{t''}$, on tire $\rho_{t'}^{t''}(1 - \delta) = \rho_{t'}^{t''} \omega \tilde{\mu} + dF_{t'}^{t''}$ puis $\rho_{t'}^{t''} = \rho_{t'}^{t''} \omega(\tilde{\mu} u) + d(F_{t'}^{t''} u)$. $\square$.

Fixons désormais un triplet $0 < t'' < t' < t$ assez petit et appelons $(\hat{L}^\bullet, \hat{\sigma}^\bullet)$ le complexe obtenu à partir du couple (M, ω) du lemme 4.4.17 selon la procédure décrite ci dessous:

M est un module hilbertien de type fini muni d'un morphisme $\omega : M \rightarrow Z^{q-1}(C^\bullet(\sigma))$. Composant ω à gauche avec $Z^{q-1}(C^\bullet(\sigma)) \rightarrow C^{q-1}(\sigma)$ puis avec les projections naturelles $C^{q-1}(\sigma) \rightarrow F^{q-1}$ et $C^{q-1}(\sigma) \rightarrow L^q$ nous obtenons deux morphismes $\hat{d} : M \rightarrow L^q$ et $\hat{\sigma} : M \rightarrow F^{q-1}$ vérifiant $\sigma^q \hat{d} = d\hat{\sigma}$, i.e.: un complexe:

$$\hat{L}^\bullet := \hat{L}^\bullet(M, \omega) = (\hat{L}^{q-1} := M) \xrightarrow{\hat{d}} L^q \xrightarrow{d} \dots$$

et un morphisme de complexes $\hat{\sigma}^\bullet := \hat{\sigma}^\bullet(M, \omega) : \hat{L}^\bullet \rightarrow F^\bullet$ défini par $\hat{\sigma}^i = \sigma^i, i \geq q$ et $\hat{\sigma}^{q-1} = -\hat{\sigma}$.

Observons que $C^i(\sigma)(s) = C^i(\hat{\sigma})(s)$, $i \geq q-1, s \leq t'$.

Lemme 4.4.18 $\rho_{*t}^{*t''} Z_*^{q-1}(t, C^\bullet(\sigma)) \subset \rho_{t'}^{*t''} Z^{q-1}(C^\bullet(\hat{\sigma}))(t') \subset \partial C_*^{q-2}(\hat{\sigma})(t'')$

Preuve : La première inclusion résulte de:

$$\rho_{*t}^{*t''} Z_*^{q-1}(t, C^\bullet(\sigma)) = \rho_{t'}^{*t''} \rho_{*t}^{t'} Z_*^{q-1}(t, C^\bullet(\sigma)) \subset \rho_{t'}^{*t''} Z^{q-1}(C^\bullet(\sigma))(t')$$

Ceci joint au lemme 4.4.17 permet d'associer à tout élément $\zeta \in Z_*^{q-1}(t, C^\bullet(\sigma))$ un élément $(\zeta', f) \in F^{q-2}(t'') \oplus M$ tel que $\rho_{*t}^{t''} \zeta = df + \omega m$.

Or, par définition, $C^{q-2}(\hat{\sigma}) = F^{q-2} \oplus M$, $C^{q-1}(\hat{\sigma}) = C^{q-1}(\sigma)$ et la différentielle de $C^\bullet(\hat{\sigma})$ est donné par la formule $\partial_{\hat{\sigma}}(f, m) = \partial_\sigma f + \omega m = df + \omega m$.

Par suite $\rho_{*t}^{*t''} \zeta = \partial_{\hat{\sigma}} \rho_{t'}^{*t''}(f, m) \in \partial C_*^{q-2}(\hat{\sigma})_*(t'')$. $\square$.

Soit $\theta < t''$.

$$\begin{aligned}
Z_*^{q-1}(\theta, C^\bullet(\hat{\sigma})) &= Z_*^{q-1}(\theta, C^\bullet(\sigma)) \\
&\subset \rho_{*t}^{*\theta} Z_*^{q-1}(t, C^\bullet(\sigma)) + \partial C_*^{q-2}(\theta, \sigma) \\
&\subset \rho_{*t''}^{*\theta} \partial C_*^{q-2}(t'', \hat{\sigma}) + \partial C_*^{q-2}(\theta, \sigma) \\
&\subset \partial C_*^{q-2}(\theta, \hat{\sigma})
\end{aligned}$$

La deuxième ligne résulte du fait que l'identité est un qi-morphisme de $C^\bullet(\sigma)$. La dernière ligne fournit $H_*^{q-1}(\theta, C^\bullet(\hat{\sigma})) = 0$. Mais,

$$i \geq q \Rightarrow H_*^i(\theta, C^\bullet(\hat{\sigma})) = 0$$

puisque en ces degrés les cohomologies de $C^\bullet(\sigma)$ et $C^\bullet(\hat{\sigma})$ sont les mêmes. Utilisant 4.4.11, nous concluons que $\hat{\sigma}$ est un qi-morphisme d'ordre q . Ceci conclut la preuve de la première assertion de la proposition 4.4.14.

La deuxième assertion se prouve par la même technique à l'aide de la propriété récursive suivante:

$P(q)$: Il existe $L^\bullet$ un complexe de module hilbertiens et deux morphismes de complexes $\psi^\bullet : T_{q-1}Q^\bullet \rightarrow L^\bullet$ et $\sigma^\bullet : L^\bullet \rightarrow F^\bullet$ un qi-morphisme d'ordre q tels que $T_{q-1}\phi^\bullet = \sigma^\bullet \psi^\bullet$.

La preuve de $P(q) \Rightarrow P(q-1)$ résulte des arguments précédents. Observons, en effet, que $\forall x \in Q^{q-1} \ d\psi^q dx = \psi^{q+1} ddx = 0$, $d\phi^{q-1}x - \sigma^q \psi^q dx = (\phi^q - \sigma^q \psi^q)dx = 0$. Par suite $e : Q^{q-1} \rightarrow C^{q-1}(\sigma) = F^{q-1} \oplus L^q$ défini par $e(x) = (-\phi^{q-1}x, \psi^q dx)$ est à valeurs dans $Z^{q-1}(C^\bullet(\sigma))$. Choisissons $t > t' > t''$ convenablement et observons que le couple (M, ω) donné par le lemme 4.4.17 a été construit comme une inclusion de sous-module fermé: $\omega : M \rightarrow Z^{q-1}(t', C^\bullet(\sigma))$. Nous définissons un nouveau couple (M', ω') comme étant l'inclusion du sous module fermé $\overline{M + eQ^{q-1}}$ qui est hilbertien de type fini. Observons que l'inclusion $M' \subset M$ induit un morphisme naturel de complexes $\mu^\bullet : \hat{L}^\bullet(M, \omega) \rightarrow \hat{L}^\bullet(M', \omega')$ tel que $\hat{\sigma}(M, \omega) = \hat{\sigma}(M', \omega')\mu^\bullet$. De cette factorisation, on déduit que $\hat{\sigma}(M', \omega')$ est un qi-morphisme d'ordre $q-1$. Par ailleurs, on vérifie aisément que poser $(\psi^{q-1} : Q^{q-1} \rightarrow \hat{L}^{q-1}(M', \omega')) := (e : Q^{q-1} \rightarrow M')$ définit un morphisme $T_{q-1}Q^\bullet \rightarrow \hat{L}^\bullet(M', \omega')$ avec les propriétés requises. $\square$.

Soit $i \in \{b, -\}$. Comme $E_f(\mathcal{A})$ a assez de projectifs, les foncteurs naturels $\mu^i : K^i(P_f(\mathcal{A})) \rightarrow D^i(E_f(\mathcal{A}))$ sont des équivalences de catégories. D'autre part, nous avons déjà implicitement rencontré le foncteur $\nu^i : K^i(P_f(\mathcal{A})) \rightarrow K^i(\text{MontMod}_{\mathcal{A}})^{qhtf}$ et on note ξ^i le foncteur de localisation:

$$\xi^i : K^i(\text{MontMod}_{\mathcal{A}})^{qhtf} \rightarrow K^i(\text{MontMod}_{\mathcal{A}})_{Q_i}^{qhtf}$$

Théoreme 4.4.19 *Le foncteur $\eta^i = \xi^i \nu^i (\mu^i)^{-1}$ réalise une équivalence de catégories*

$$\eta^i : D^i(E_f(\mathcal{A})) \rightarrow K^i(\text{MontMod}_{\mathcal{A}})_{Q_i}^{qhtf}$$

Preuve: Ce théorème résulte via [25], prop. 3.3, p.33 du premier point de la proposition 4.4.14.

De 4.4.14, le lecteur ignorant tout des catégories dérivées pourra déduire le fait que, pour tout complexe de modules montéliens qhtf borné supérieurement $F^\bullet$, $\varinjlim_{t \rightarrow 0} H^q(t, F^\bullet)$ s'obtient comme image par le foncteur d'oubli O d'un élément bien déterminé de $E_f(\mathcal{A})$. Moins précis que 4.4.19, ce dernier énoncé pourrait suffire.

5 Théorème A de Cartan en Cohomologie L^2

5.1 Résolution de Dolbeault, acyclicité locale des images directes L^2 et résolution de Čech

Soit $\tilde{X}$ une Γ -variété complexe. Soit $\pi : \tilde{X} \rightarrow X = \Gamma \backslash \tilde{X}$.

Soit $\mathcal{V} \in V_{\Gamma, X}(\tilde{X})$. Soit V le fibré vectoriel associé que l'on munit d'une métrique hermitienne.

Soit U un ouvert de X . On pose:

$$\mathcal{D}_2^{0,q}(\mathcal{V})(U) = \{s \in L_{loc}^2(\pi^{-1}(U), V \otimes \Omega^{0,q}) : \forall K \subset\subset U \int_K \|s\|^2 + \|\bar{\partial}s\|^2 < \infty\}$$

Et on définit un complexe de faisceaux, que nous appellerons le complexe de Dolbeault L^2 local, par la formule:

$$\mathcal{D}_2^\bullet(\mathcal{V}) = (\mathcal{D}_2^{0,0}(\mathcal{V}) \xrightarrow{\bar{\partial}} \mathcal{D}_2^{0,1}(\mathcal{V}) \rightarrow \dots)$$

Lemme 5.1.1 $l^2\pi_*\mathcal{V} \rightarrow \mathcal{D}_2^\bullet(\mathcal{V})$ est une résolution acyclique de $l^2\pi_*\mathcal{V}$.

Preuve: C'est clair. Donnons pourtant les détails.

Il existe une partition de l'unité lisse et Γ -invariante sur $\tilde{X}$ subordonnée à l'image réciproque d'un recouvrement ouvert quelcoque de X . Par suite, les faisceaux $\mathcal{D}_2^{0,q}(\mathcal{V})$, $q \geq 0$ sont mous et donc acycliques.

Une section L_{loc}^2 d'un fibré holomorphe tuée par l'opérateur $\bar{\partial}$ est holomorphe, d'où l'exactitude au premier terme.

L'exactitude aux termes suivants résulte des estimées L^2 d'Hörmander:

Soit $q > 0$. Soit $x \in X$. Soit $\phi_x \in \mathcal{D}_2^{0,q}(\mathcal{V})_x$. On suppose $\bar{\partial}\phi_x = 0$. On peut supposer que ϕ_x est le germe en x de ϕ une section L^2 de V sur un ouvert Γ -Stein $\tilde{U}$. $\tilde{U} = \Gamma U^0$ avec U^0 une composante connexe de stabilisateur fini Σ . Soit P une fonction Γ -invariante, Γ -exhaustive strictement psh et lisse sur X . Soit $t > \min P$ et $x \in \tilde{U}_t = P^{-1}(]-\infty, t])$. On peut s'arranger pour trouver une métrique de Kähler sur U_t^0 et complète (U_t^0 est une variété de Stein.) que, par moyennisation, on peut supposer invariante par le sous groupe fini

$\Sigma \subset \Gamma$. Cette métrique se transporte à une métrique Γ -invariante ω complète sur $\tilde{U}_t = \Gamma/\Sigma \times U_t^0$. Composant la fonction psh $P - \min_U P + 1$ avec une fonction convexe croissante au comportement suffisamment explosif on trouve une fonction plurisousharmonique ψ , Γ -invariante telle que $\int_{\tilde{U}_t} e^{-\psi} \|\phi\|^2 \omega^n < +\infty$ et telle que $\mathcal{V} \otimes K_X^{-1}$ est uniformément strictement négatif au sens de Nakano pour la métrique hermitienne $h' = e^{-\psi} \|\cdot\|_h^2(\omega^n)$.

Utilisant la formule de Bochner-Kodaira-Nakano et la technique d'Hörmander, [7] pp. 26-32, on trouve μ une $q-1$ forme telle que $\bar{\partial}\mu = \phi$ et $\int e^{-\psi} \|\mu\|_h^2(\omega^n) < +\infty$ et en particulier $\mu \in L_{loc}^2(\tilde{U}_t)$. Son germe en x , noté μ_x , vérifie $\bar{\partial}\mu_x = \phi_x$. $\square$.

Corollaire 5.1.2 *Soit $\mathcal{V} \in V_{\Gamma, \chi}(\tilde{X})$. Si $\tilde{X}$ est Γ -Stein, alors $H_{(2)}^q(\tilde{X}, \mathcal{V}) = 0$ pour $q > 0$.*

Preuve: Par le lemme 5.1.1, on peut utiliser le complexe de Dolbeault L^2 local pour calculer ce groupe de cohomologie. Par ailleurs, la preuve de 5.1.1 fournit la conclusion désirée. $\square$.

Proposition 5.1.3 *Soit $\mathcal{F} \in C_{\Gamma, \chi}(\tilde{X})$. Si $\tilde{X}$ est Γ -Stein, $H_{(2)}^q(\tilde{X}, \mathcal{F}) = 0$ pour $q > 0$.*

Preuve : Soit $\tilde{V}$ un ouvert Γ -Stein de $\tilde{X}$ tel que $\Gamma \backslash \tilde{V} \subset \subset \Gamma \backslash \tilde{X}$. Soit $R_{\mathcal{F}}^{\bullet} \rightarrow \mathcal{F}$ une résolution périodique localement libre finie de $\mathcal{F}$ définie sur $\tilde{V}$. Par la proposition 3.2.3, le complexe de faisceaux suivant est exact:

$$\dots \rightarrow l^2 \pi_* R_{\mathcal{F}}^{-1} \rightarrow l^2 \pi_* R_{\mathcal{F}}^0 \rightarrow l^2 \pi_* \mathcal{F} \rightarrow 0$$

Par suite $H_{(2)}^q(\tilde{V}, \mathcal{F}) \simeq \mathbb{H}^q(V, \dots \rightarrow l^2 \pi_* R_{\mathcal{F}}^{-1} \rightarrow l^2 \pi_* R_{\mathcal{F}}^0)$.

Le corollaire 5.1.2 implique que $H^i(V, l^2 \pi_* R_{\mathcal{F}}^j) = 0, i > 0$. La suite spectrale d'hypercohomologie (voir [18], pp. 445-447) $({}''E_r^{pq})_r$ vérifie donc ${}''E_1^{pq} = 0$ si $q \neq 0$ et de plus, ${}''E_1^{p,0} = H^0(V, l^2 \pi_* R_{\mathcal{F}}^p)$. De là ${}''E_1^{p,0} = 0, p > 0$. De ce fait $({}''E_r^{pq})_r$ dégénère en ${}''E_2$ et ${}''E_2^{p,q} = 0$ sauf éventuellement quand $p = 0$ et $q \leq 0$. Puis $\mathbb{H}^q(V, l^2 \pi_* R_{\mathcal{F}}^{\bullet}) = 0$ sauf éventuellement si $q \leq 0$. En particulier $H_{(2)}^q(\tilde{V}, \mathcal{F}) = 0, q > 0$ (et aussi bien sûr ${}''E_2^{p,q} = 0, (p, q) \neq (0, 0)$, car un faisceau n'a pas de cohomologie en degrés négatifs.)

Comme $\varprojlim_{V \subset \subset U} H_{(2)}^q(\tilde{V}, \mathcal{F}) = H_{(2)}^q(\tilde{U}, \mathcal{F})$, le lemme est démontré. $\square$.

Proposition 5.1.4 *Soit $\tilde{Z}$ un Γ -espace complexe Γ -Stein. Soit $\mathcal{F} \in C_{\Gamma}(\tilde{Z})$. Pour tout $q \geq 1, H_{(2)}^q(\tilde{Z}, \mathcal{F}) = 0$.*

Preuve: En effet, il existe un Γ -plongement fermé $i : \tilde{Z} \rightarrow \tilde{X}$ où $\tilde{X}$ est une Γ -variété Γ -Stein et il ressort de 3.2.1, 3.2.2 que $H_{(2)}^q(\tilde{Z}, \mathcal{F}) = H_{(2)}^q(\tilde{X}, i_* \mathcal{F})$. 5.1.4 est donc un corollaire de 5.1.3.

Soit $\mathfrak{V} = \{\tilde{V}_i\}_{i \in A}$ un recouvrement ouvert d'un espace topologique. On note $PF(A)$ l'ensemble des parties finies de A . Pour $\alpha = \{i_1, \dots, i_p\} \in PF(A)$, on note $V_\alpha = V_{i_1} \cap \dots \cap V_{i_p}$.

Corollaire 5.1.5 *Soit $\tilde{Z}$ un Γ -espace complexe et $\mathcal{F} \in C_{\bar{\Gamma}}(\tilde{Z})$.*

Soit $\mathfrak{U} = \{\tilde{U}_i\}_{i \in A}$ un recouvrement ouvert Γ -invariant Γ -localement fini¹⁴ de $\tilde{Z}$ par des ouverts Γ -Stein.

Le complexe de Čech dont les espaces de cochaines sont définies par:

$$C_2^p(\tilde{\mathfrak{U}}, \mathcal{F}) = \bigoplus_{\alpha \in PF(A) \mid |\alpha|=p+1} H^0(\tilde{U}_\alpha, l^2 \pi_* \mathcal{F})$$

et les différentielles par la formule usuelle calcule la cohomologie L^2 de $\mathcal{F}$.

5.2 Structures topologiques sur $H_{(2)}^0(\tilde{X}, \mathcal{F})$

Faisceaux localement libres sur un espace réduit Soit $\tilde{U}$ un Γ -espace Γ -Stein et réduit. Soit P une fonction strictement psh sur $\tilde{U}$ Γ -invariante et Γ -exhaustive.

On réutilise les notations du lemme 3.1.2 en posant $\tilde{U}_t = P^{-1}(] - \infty, t[)$.

Soit $\mathcal{V} \in V_{\bar{\Gamma}, \chi}(\tilde{U})$. Fixons une métrique hermitienne sur $\mathcal{V}$ définie sur un ouvert de la forme $\tilde{U}_{t_0}$, $t_0 > 0$.

On définit, pour tout $t < t_0$, $L^2(\tilde{U}_t, \mathcal{V})$ comme l'espace des sections holomorphes L^2 de $\mathcal{V}$ sur $\tilde{U}_t$ muni de la norme hilbertienne $\|\cdot\|_t$ définie par l'intégration sur $\tilde{U}_t$ du carré de la norme d'une section.

Lemme 5.2.1 *$(L^2(\tilde{U}_t, \mathcal{V}), \|\cdot\|_t)$ est un $W^*(\bar{\Gamma}, \chi)$ -module hilbertien projectif métrisé.*

Preuve : Rappelons que si le groupe G agit à gauche sur un ensemble E , l'action se relevant à un fibré vectoriel $F \rightarrow E$, G agit sur l'espace des sections ϕ de E par $L_g \phi(x) = g\phi(g^{-1}x)$.

Cela étant dit, à $s \in L^2(\tilde{U}_t, \mathcal{V})$, on associe la fonction sur $\bar{\Gamma}$ à valeurs dans l'espace de Hilbert $H_t = L^2(U_t^0, \mathcal{V})$:

$$F_t(s)(\bar{g}) = L_{\bar{g}^{-1}} s|_{U_t^0}$$

$F_t(s)$ est une fonction L^2 sur $\bar{\Gamma}$ à valeurs dans l'espace de Hilbert H_t . L'application linéaire résultante $I_t : L^2(\tilde{U}_t, \mathcal{V}) \rightarrow L^2(\bar{\Gamma}) \hat{\otimes} H_t$ est un plongement isométrique $\bar{\Gamma}$ -équivariant.

Toute fonction de la forme $F = F_t(s)$ vérifie $\forall z \in S, \chi(z)F(\bar{g}z) = F(\bar{g})$. Par suite I_t est à valeurs dans $E_\chi \otimes H_t$.

Ceci réalise $L^2(\tilde{U}_t, \mathcal{V})$ comme un $W^*(\bar{\Gamma}, \chi)$ -module hilbertien projectif.

¹⁴Ceci signifie, par définition, que le recouvrement de $Z = \Gamma \backslash \tilde{Z}$ donné par $\{\Gamma \backslash \tilde{U}_i\}_{i \in A}$

Lemme 5.2.2 $\forall t' < t$ l'application de restriction $\rho_t^{t'} : L^2(\tilde{U}_t, \mathcal{V}) \rightarrow L^2(\tilde{U}_{t'}, \mathcal{V})$ est une contraction injective $W^*(\bar{\Gamma}, \chi)$ -compacte.

Preuve : Pour $t' < t$, on a un diagramme commutatif:

$$\begin{array}{ccc} L^2(\tilde{U}_t, \mathcal{V}) & \xrightarrow{\rho_t^{t'}} & L^2(\tilde{U}_{t'}, \mathcal{V}) \\ \downarrow I_t & & \downarrow I_{t'} \\ E_\chi \otimes H_t & \xrightarrow{Id_{E_\chi} \otimes r_t^{t'}} & E_\chi \otimes H_{t'} \end{array}$$

$r_t^{t'}$ désigne l'application de restriction $H_t \rightarrow H_{t'}$. Par le théorème de Montel, $r_t^{t'}$ est compact (au sens habituel, c'est à dire $\mathbb{C}$ -compact au sens de cet article). On déduit que $\rho_t^{t'}$ est $W^*(\bar{\Gamma}, \chi)$ -compact en utilisant $\|Id \otimes a\| \leq \|a\|$. $\rho_t^{t'}$ est injective grâce à l'unicité du prolongement analytique.

Corollaire 5.2.3 La donnée $W = (\{L^2(\tilde{U}_t, \mathcal{V})\}_{0 < t < t_0}, \{\rho_t^{t'}\}_{0 < t' \leq t < t_0})$ définit un $W^*(\bar{\Gamma}, \chi)$ -module prémontélien au sens de la définition 4.4.6.

De plus, pour tout $t_0 > t > 0$, $W_*(t) = H_{(2)}^0(\tilde{U}_t, \mathcal{V})$.

Faisceaux analytiques cohérents sur un espace réduit

Lemme 5.2.4 Soit $\mathcal{F} \in C_{(\bar{\Gamma}, \chi)}(\tilde{U})$.

$H_{(2)}^0(\tilde{U}_t, \mathcal{F})$ possède une structure canonique d'espace de Fréchet.

Soit c une présentation localement libre de $\mathcal{F}$ sur $\tilde{U}$, c'est à dire un épimorphisme périodique de la forme $\mathcal{W} \xrightarrow{c} \mathcal{F} \rightarrow 0$ où $V \in V_{\bar{\Gamma}, \chi}(\tilde{U})$.

La structure d'espace de Fréchet de $H_{(2)}^0(\tilde{U}, \mathcal{F})$ peut être définie par une famille $(\|\cdot\|_{t'}^c)_{t' < t}$ croissante de semi-normes préhilbertiennes Γ -invariantes.

Le séparé complété de $(H_{(2)}^0(\tilde{U}_t, \mathcal{F}), \|\cdot\|_{t'}^c)$ est indépendant de t , est un $(\bar{\Gamma}, \chi)$ -module hilbertien projectif séparable noté $L^2(\tilde{U}_{t'}, \mathcal{F})_c$.

Les morphismes naturels $\rho_{t'}^{t''} : L^2(\tilde{U}_{t'}, \mathcal{F})_c \rightarrow L^2(\tilde{U}_{t''}, \mathcal{F})_c$ induits par l'identité de $H_{(2)}^0(\tilde{U}_t, \mathcal{F})$ sont continus et $W^*(\bar{\Gamma}, \chi)$ -compacts.

La donnée $\mathcal{L}^2(\tilde{U}, \mathcal{F})_{c,P} = (\{L^2(\tilde{U}_t, \mathcal{F})_c\}_{0 < t < t_0}, \{\rho_t^{t'}\}_{0 < t' \leq t < t_0})$ définit un $W^*(\bar{\Gamma}, \chi)$ -module prémontélien.

De plus, pour tout $t > 0$ assez petit $(\mathcal{L}^2(\tilde{U}, \mathcal{F})_{c,P})_*(t) = H_{(2)}^0(\tilde{U}_t, \mathcal{F})$.

Preuve : A cause du lemme 5.2.2, c'est le cas si $\mathcal{F}$ est localement libre, les semi-normes étant de vraies normes.

Soit $\mathcal{K}$ le noyau de $\mathcal{W} \rightarrow \mathcal{F}$ et $\mathcal{V} \rightarrow \mathcal{K}$ un épimorphisme périodique, défini sur $\tilde{U}_{t_0}$.

La proposition 5.1.4 présente $H_{(2)}^0(\tilde{U}_t, \mathcal{F})$ comme le conoyau du morphisme continu $H_{(2)}^0(\tilde{U}_t, \mathcal{V}) \rightarrow H_{(2)}^0(\tilde{U}_t, \mathcal{W})$.

Grâce à 5.1.4 l'image de ce morphisme est $H_{(2)}^0(\tilde{U}_t, \mathcal{K})$. En vertu de 3.1.3 ce sous espace est fermé pour la topologie de Fréchet. Le quotient d'un espace

de Fréchet par un sous espace fermé est un espace de Fréchet. Ceci construit une structure de Fréchet sur $H_{(2)}^0(\tilde{U}_t, \mathcal{F})$.

Posant pour $f \in H_{(2)}^0(\tilde{U}_t, \mathcal{F})$:

$$\|f\|_{t'}^c = \inf_{w \in H_{(2)}^0(\tilde{U}_t, \mathcal{W}), c(w)=f} \|w\|_{t'}$$

nous obtenons une seminorme $\|\cdot\|_{t'}^c$ sur $H_{(2)}^0(\tilde{U}_t, \mathcal{F})$. Elle est préhilbertienne, car elle vérifie l'identité du parallélogramme.

Considérons l'espace vectoriel normé $(H_{(2)}^0(\tilde{U}_t, \mathcal{F})/Ker\|\cdot\|_{t'}^c, \|\cdot\|_{t'}^c)$. Son complété est, par définition $L^2(\tilde{U}_{t'}, \mathcal{F})_{c,t}$. c définit une contraction continue et surjective

$$(H_{(2)}^0(\tilde{U}_t, \mathcal{V}), \|\cdot\|_{t'}) \rightarrow (H_{(2)}^0(\tilde{U}_t, \mathcal{F})/Ker\|\cdot\|_{t'}^c, \|\cdot\|_{t'}^c)$$

Par suite c se prolonge aux complétés de ces espaces vectoriels normés et définit une surjection continue $L^2(\tilde{U}_{t'}, \mathcal{V}) \rightarrow L^2(\tilde{U}_{t'}, \mathcal{F})_{c,t}$ qui munit $L^2(\tilde{U}_{t'}, \mathcal{F})_{c,t}$ d'une structure de $(\bar{\Gamma}, \chi)$ -module hilbertien grâce à 5.2.1 . Pour tous $t_1 > t_2 > t'$ $H_{(2)}^0(\tilde{U}_{t_1}, \mathcal{V})$ est dense dans $H_{(2)}^0(\tilde{U}_{t_2}, \mathcal{V})$ pour la norme $\|\cdot\|_{t'}$, ce qui implique que $(L^2(\tilde{U}_{t'}, \mathcal{F})_{c,t}, \|\cdot\|_{t'}^c)$ est indépendant de $t > t'$. On peut donc le noter $(L^2(\tilde{U}_{t'}, \mathcal{F})_c, \|\cdot\|_{t'}^c)$.

Les autres points de l'énoncé sont des conséquences directes de 5.2.2, à l'exception de l'indépendance de la présentation c de la structure de Fréchet sur $H_{(2)}^0(\tilde{U}_t, \mathcal{F})$. Il suffit de comparer les structures de Fréchet associées à deux présentations locales localement libres de $\mathcal{F}$ c et c' telles qu'il existe un morphisme de présentations $c' \rightarrow c$, tous ces objets pouvant être définis sur un voisinage de $\tilde{U}_{t_0}$. Un morphisme de présentations est un diagramme de la forme:

$$\begin{array}{ccccccc} \mathcal{W}' & \xrightarrow{c'} & \mathcal{F} & \rightarrow & 0 \\ \downarrow & & \parallel & & \\ \mathcal{W} & \xrightarrow{c} & \mathcal{F} & \rightarrow & 0 \end{array}$$

Dans ces conditions, pour tout $t' < t_0$, il existe $K > 0$ $\|\cdot\|_{t'}^c \leq K\|\cdot\|_{t'}^{c'}$. Par suite:

$$Id : (H_{(2)}^0(\tilde{U}_t, \mathcal{F}), \{\|\cdot\|_{t'}^{c'}\}_{t'>0}) \rightarrow (H_{(2)}^0(\tilde{U}_t, \mathcal{F}), \{\|\cdot\|_{t'}^c\}_{t'>0})$$

est continue et les deux structures de Fréchet $F_{c'}$ et F_c définies respectivement par c et c' coïncident. $\square$.

Un point ennuyeux est que ceci ne signifie pas que $\|\cdot\|_{t'}^c$ est équivalente à $\|\cdot\|_{t'}^{c'}$. Ceci se traduit par le fait désagréable que le module montélien $\mathcal{L}^2(\tilde{U}, \mathcal{F})_{c,P}$ dépend de c et P .

Cas général

Définition 5.2.5 Soit $\tilde{Z}$ un Γ -espace Γ -Stein, $i : \tilde{Z} \rightarrow \tilde{X}$ un plongement fermé vers un Γ -espace Γ -Stein, P une fonction strictement psh lisse Γ -exhaustive sur X et c une présentation dans $V_{\tilde{F}}(\tilde{X})$ de $i_*\mathcal{F}$.

On définit $\mathcal{L}^2(\tilde{Z}, i, P, c, \mathcal{F})$ comme le module montélien $\mathcal{L}^2(\tilde{X}, i_*\mathcal{F})_{c,P}$.

Lemme 5.2.6 $\mathcal{L}^2(\tilde{Z}, i, P, c, \mathcal{F})_*(t) = H_{(2)}^0(\tilde{Z}_t, \mathcal{F})$

Preuve: Ceci résulte de 3.2.1, 3.2.2 et 5.2.4.

Structure de Fréchet

Proposition 5.2.7 Soit $\tilde{X}$ un Γ -espace complexe. Soit $\mathcal{F}$ un faisceau cohérent $(\bar{\Gamma}, \chi)$ -périodique sur $\tilde{X}$.

$H_{(2)}^0(\tilde{X}, \mathcal{F})$ possède une structure canonique d'espace de Fréchet. De plus, cette structure d'espace de Fréchet peut être définie par une famille (non canonique) $(\|\cdot\|_n)_{n \in \mathbb{N}}$ croissante de prénormes préhilbertiennes $\bar{\Gamma}$ -invariantes dont les séparés complétés sont des $(\bar{\Gamma}, \chi)$ -modules hilbertiens séparables.

Preuve: Utilisant qu'un espace complexe est paracompact et vérifie le second axiome de dénombrabilité, on munit les termes C^0 et C^1 du complexe de Čech de $l^2\pi_*\mathcal{F}$ associé à un recouvrement Γ -localement fini par ouverts Γ -pseudoconvexe d'une telle structure de Fréchet. La différentielle de Čech est alors continue et le résultat s'ensuit. Puisque cette proposition ne servira pas dans la suite de ce texte, la preuve de l'unicité de la structure de Fréchet ainsi fabriquée est laissée au lecteur.

5.3 Théorème de finitude

Le but de ce paragraphe est d'associer au complexe de Čech L_2 de 5.1.5 un complexe de modules montéliens qhtf qui lui soit quasi isomorphe. Nous n'avons pu mener à bien la construction sans une certaine quantité de données annexes qui rendent lourde la rédaction d'une construction aisée dans son principe.

Soit $\tilde{Z}$ un espace complexe cocompact.

Constructions

Définition 5.3.1 Soit Z un espace complexe. Soit $\mathcal{F}$ un faisceau analytique cohérent sur Z .

Soit i_l , $l = 1, 2$ un plongement localement fermé vers l'espace complexe Z_l , p un morphisme tel que $i_1 = p \circ i_2$, $c_1\mathcal{V}_1 \rightarrow i_{1*}\mathcal{F}$ une présentation.

La présentation $p^{-1}c_1 : p^*\mathcal{V} \rightarrow i_{2*}\mathcal{F}$ est l'unique présentation telle que pour tous $z \in Z$, $f \in \mathcal{F}_z$, $s \in \mathcal{V}_{i_1(z)}$ tels que $c_1(s) = i_{1*}f$ on ait $p^{-1}c_1(p^*s) = i_{2*}f$.

Définition 5.3.2 Soit $\tilde{Z}$ un Γ -espace complexe. $\hat{C}_{\bar{\Gamma},\chi}(\tilde{Z})$ désigne la catégorie suivante:

- Les objets sont les quintuplets $(\mathcal{F}, \tilde{U}, i, P, c)$, $\mathcal{F} \in C_{\bar{\Gamma},\chi}(\tilde{Z})$, $\tilde{U}$ un ouvert Γ -invariant de $\tilde{Z}$, $i : \tilde{U} \rightarrow \tilde{X}$ un plongement fermé vers le Γ -espace complexe réduit $\tilde{X}$, P une Γ -fonction continue strictement psh et Γ -exhaustive et $c : \mathcal{V} \rightarrow i_*\mathcal{F}$ une présentation localement libre périodique.
- Soient $X_l = (\mathcal{F}_l, \tilde{U}_l, i_l, P_l, c_l)$ $l = 1, 2$ deux objets.

Il n'y a de flèche $X_1 \rightarrow X_2$ que si $\tilde{U}_2 \subset \tilde{U}_1$ auquel cas une flèche est la donnée d'un triplet (ϕ, p, λ) où $\phi : \mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{F}_2$ est un $\bar{\Gamma}$ -morphisme $p : X_2 \rightarrow X_1$ une application holomorphe telle que $i_1 = p \circ i_2$, $P_2 \geq P_1 \circ p$ et $\lambda : p^*\mathcal{V}_1 \rightarrow \mathcal{V}_2$ est un morphisme périodique faisant commuter le diagramme:

$$\begin{array}{ccc} p^*\mathcal{V}_1 & \xrightarrow{p^{-1}c_1} & i_{2*}\mathcal{F}_1 \\ \lambda \downarrow & & i_{2*}\phi \downarrow \\ \mathcal{V}_2 & \xrightarrow{c_2} & i_{2*}\mathcal{F}_2 \end{array}$$

- La composition des flèches est donnée par la formule évidente.

Reformulons la définition 5.2.5 et le lemme 5.2.6 comme suit:

Lemme 5.3.3 *Il existe un foncteur covariant $\mathcal{L}^2 : \hat{C}_{\bar{\Gamma},\chi}(\tilde{Z}) \rightarrow \text{MontMod}_{W^*(\bar{\Gamma},\chi)}$ tel que pour toute flèche F de la forme*

$$F : X_1 = (\mathcal{F}_1, \tilde{U}_1, i_1, P_1, c_1) \xrightarrow{(\phi, p, \lambda)} X_2 = (\mathcal{F}_2, \tilde{U}_2, i_2, P_2, c_2)$$

et tout $t > 0$ assez petit, le morphisme induit par le lemme 5.2.6

$$\mathcal{L}^2(F)_*(t) : H_{(2)}^0(\{z \in \tilde{U}_1 | P_1(z) < t\}, \mathcal{F}_1) \rightarrow H_{(2)}^0(\{z \in \tilde{U}_2 | P_2(z) < t\}, \mathcal{F}_2)$$

soit égal à la composition du morphisme $H_{(2)}^0(\phi)$ et de la restriction de U_1 à U_2 .

Définition 5.3.4 Définissons une catégorie $\tilde{C}_{\bar{\Gamma},\chi}(\tilde{Z})$ par les données suivantes:

- Objets: Un objet de $\tilde{C}_{\bar{\Gamma},\chi}(\tilde{Z})$ est une famille d'objets de $\hat{C}_{\bar{\Gamma}}(\tilde{Z})$, $D = (X_l = (\mathcal{F}_l, \tilde{U}_l, i_l, P_l, c_l))_{l \in A}$ sujette aux restrictions suivantes:
 - $X_l \in \hat{C}_{\bar{\Gamma},\chi}(\tilde{Z})$
 - Il existe un faisceau analytique cohérent périodique $\mathcal{F} = \mathcal{F}_D \in C_{\bar{\Gamma},\chi}(\tilde{Z})$, tel que $\forall l \quad \mathcal{F}_l = \mathcal{F}$.
 - $(\tilde{U}_l)_l$ est un recouvrement Γ -localement fini de $\tilde{Z}$
 - $(\{z \in \tilde{U}_l | P_l(z) < 0\})_l$ est aussi un recouvrement de $\tilde{Z}$.
- Morphismes: Une flèche $F : (X_l^1)_{l \in A} \rightarrow (X_n^2)_{n \in B}$ est la donnée d'un morphisme périodique $\phi : \mathcal{F}_{D^1} \rightarrow \mathcal{F}_{D^2}$, d'une application $\rho : B \rightarrow A$ et de $\hat{C}_{\bar{\Gamma},\chi}(\tilde{Z})$ -flèches $F_n : X_{\rho(n)}^1 \rightarrow X_n^2$, avec $F_n = (\phi, p_n, c_n)$ et ρ définit un raffinement $(\{z \in \tilde{U}_l^2 | P_l^2(z) < 0\})_{l \in B} \rightarrow (\{z \in \tilde{U}_l^1 | P_l^1(z) < 0\})_{l \in A}$.
- La composition de deux flèches est définie par la formule évidente.

Soit D un objet de $\tilde{C}_{\bar{\Gamma},\chi}(\tilde{Z})$.

Pour $\alpha \in PF(A)$ on définit un objet $X_\alpha = (\mathcal{F}_\alpha, \tilde{U}_\alpha, i_\alpha, P_\alpha, c_\alpha)$ de $\hat{C}_{\bar{\Gamma}}(\tilde{Z})$ en posant:

- $\mathcal{F}_\alpha = \mathcal{F}_D$
- $\tilde{U}_\alpha = \cap_{l \in \alpha} \tilde{U}_l$
- $i_\alpha = \times_{l \in \alpha} i_l$
- $P_\alpha = \max_{l \in \alpha} P_l$
- $c_\alpha : \mathcal{V}_\alpha \rightarrow i_{\alpha*} \mathcal{F} = \sum_{l \in \alpha} p_{l,\alpha}^{-1} c_l : \oplus_{l \in \alpha} p_{l,\alpha}^* \mathcal{V}_l \rightarrow p_{i,\alpha*} \mathcal{F}_D$ où $p_{l,\alpha} : \times_{k \in \alpha} X_k \rightarrow X_l$ est la projection naturelle.

Par construction, pour tout $(\alpha, \alpha') \in PF(A)$ tel que $\alpha' \subset \alpha$, le triplet $\rho_\alpha^{\alpha'} = (\phi_\alpha^{\alpha'}, p_\alpha^{\alpha'}, \lambda_\alpha^{\alpha'})$ avec $\phi_\alpha^{\alpha'} = Id$, $p_\alpha^{\alpha'} = \times_{l \in \alpha'} p_{l,\alpha}$, $\lambda_\alpha^{\alpha'}$ est l'inclusion naturelle $\sum_{l \in \alpha'} p_{l,\alpha}^* \mathcal{V}_l \rightarrow \sum_{l \in \alpha} p_{l,\alpha}^* \mathcal{V}_l$ est un $\hat{C}_{\bar{\Gamma}}(X)$ -morphisme.

De plus, on a la condition $\rho_\alpha^{\alpha''} \rho_\alpha^{\alpha'} = \rho_\alpha^{\alpha''}$.

On définit un $W^*(\bar{\Gamma}, \chi)$ -module montélien grâce à 5.2.4, en posant:

$$\mathcal{L}^2 C^p(D) = \oplus_{|\alpha|=p+1} \mathcal{L}^2(X_\alpha)$$

Imitons la définition de la différentielle de Čech en définissant $\delta : \mathcal{L}^2 C^p(D) \rightarrow \mathcal{L}^2 C^{p+1}(D)$ comme le morphisme dont la matrice est $(\epsilon_{\alpha,\alpha'} \mathcal{L}^2(\rho_\alpha^{\alpha'}))_{\alpha,\alpha'}$, avec $\epsilon_{\alpha,\alpha'} = \pm 1$, le signe étant donné par la règle usuelle pour la différentielle de Čech.

Par 5.2.4, $(\mathcal{L}^2 C^\bullet(D), \delta)$ est un complexe borné de modules montéliens.

Lemme 5.3.5 $(\mathcal{L}^2 C^\bullet(D), \delta)$ est un complexe de modules montéliens qhtf et pour tout $t > 0$ assez petit $H_*^\bullet(t, (\mathcal{L}^2 C^\bullet(D), \delta)) = H_{(2)}^\bullet(\tilde{Z}, \mathcal{F}_D)$.

Preuve : En effet, grâce à 5.2.6, $(\mathcal{L}^2 C^\bullet(D)_*(t), \delta)$ s'identifie au complexe de Čech L_2 de $\mathcal{F}$ relatif au recouvrement $(\{z \in U_l | P_l(z) < t\}_l)$ (cf. la définition du corollaire 5.1.5) .

Par construction, on a:

Lemme 5.3.6 L'assignement $D \mapsto (\mathcal{L}^2 C^\bullet(D), \delta)$ est sous jacent à un foncteur covariant $\tilde{C}_{\bar{\Gamma}, \chi}(\tilde{Z}) \rightarrow C^b(\text{MontMod}_{W^*(\bar{\Gamma}, \chi)})^{\text{qhtf}}$.

Unicité, Existence, Functorialité Ce paragraphe utilise les notations du théorème 4.4.19.

Lemme 5.3.7 Soit $\mathcal{F}$ un objet de $C_{\bar{\Gamma}, \chi}(\tilde{Z})$. Pour tout couple D^1, D^2 d'objets de $\tilde{C}_{\bar{\Gamma}, \chi}(\tilde{Z})$, tel que $\mathcal{F}_{D^i} = \mathcal{F}$, on peut construire un isomorphisme entre $(\mathcal{L}^2 C^\bullet(D^1), \delta)_{Q_i}$ et $(\mathcal{L}^2 C^\bullet(D^2), \delta)_{Q_i}$, unique dans $K^b(\text{MontMod}_{W^*(\bar{\Gamma}, \chi)})_{Q_i}^{\text{qhtf}}$.

Preuve: En effet, on peut toujours trouver un objet D^3 tel que $\mathcal{F}_{D^3} = \mathcal{F}$ et des $\tilde{C}_{\bar{\Gamma}, \chi}(\tilde{Z})$ -flèches $D^i \rightarrow D^3$ dont le $C_{\bar{\Gamma}, \chi}(\tilde{Z})$ morphisme associé est l'identité. La flèche $(\mathcal{L}^2 C^\bullet(D_1), \delta) \rightarrow (\mathcal{L}^2 C^\bullet(D_3), \delta)$ est un qi-morphisme puisqu'elle induit des isomorphismes sur les groupes de cohomologie par 5.3.5. Ce qi-morphisme définit après localisation un isomorphisme en cohomologie qui est indépendant de la flèche $D_1 \rightarrow D_3$ choisie puisqu'il relève les applications de raffinement entre complexes de Čech L_2 de $\mathcal{F}$. $\square$

Soit $\mathcal{F}$ un faisceau cohérent $(\bar{\Gamma}, \chi)$ -périodique. Utilisant 2.3.1, on construit aisément un objet $D(\mathcal{F})$ de $\tilde{C}_{\bar{\Gamma}}(\tilde{Z})$ avec $\mathcal{F}_{D(\mathcal{F})} = \mathcal{F}$. Toujours avec 2.3.1, il est possible de relever toute flèche $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ en une flèche $D(\mathcal{F}) \rightarrow D(\mathcal{G})$. En raison de 5.3.7, on prouve le:

Théoreme 5.3.8 Soit $\tilde{X}$ un Γ -espace complexe cocompact.

Il existe un foncteur triangulé (unique à équivalence près)

$$R : D^i(C_{\bar{\Gamma}, \chi}(\tilde{X})) \rightarrow D^i(E_f(W^*(\bar{\Gamma}, \chi))) \quad i = b, -$$

spécialisant au δ -foncteur $(H_{(2)}^q(\tilde{X}, \cdot), \delta)_{q \geq 0}$ de 3.3.1 par oubli de structure (cf. 4.3.6). Le foncteur R est le foncteur dérivé du foncteur sections globales L_2 .

Soit $H_2^q(\tilde{X}, \mathcal{F})$ l'objet de $E_f(W^*(\bar{\Gamma}, \chi))$ défini par $H_2^q(\tilde{X}, \mathcal{F}) = H^q(R(\mathcal{F}))$. L'assignement $\mathcal{F} \mapsto H_2^q(\tilde{X}, \mathcal{F})$ est sous jacent à un δ -foncteur $(H_2^q(\tilde{X}, \cdot), \delta)$ défini sur $C_{\bar{\Gamma}, \chi}(\tilde{Z})$ et à valeurs dans $E_f(\Gamma)$ relevant à le δ -foncteur 3.3.2 $(H_2^q(\tilde{X}, \cdot), \delta)$, qui lui est à valeurs à valeurs dans $E_f(W^*(\bar{\Gamma}, \chi))$

Si $\tilde{X}$ n'est pas supposé cocompact, le théorème précédent est valable dans le cas des faisceaux de support Γ -compact. Adapter la preuve donnée ci dessus est trivial.

Pour justifier le titre de cet article, donnons la définition:

Définition 5.3.9 Soit $(\tilde{X}, \Gamma, \rho)$ un Γ -espace complexe.

Les invariants de Von Neumann d'un faisceau analytique cohérent $(\bar{\Gamma}, \chi)$ -périodique $\mathcal{F}$ sont:

- Les nombres de Betti L^2 de $\mathcal{F}$, $h_2^q(\tilde{X}, \mathcal{F}) := \dim_{W_l^*(\bar{\Gamma}, \chi)} H_2^q(\tilde{X}, \mathcal{F}) \in \mathbb{R}^+$
- Les invariants de Novikov-Shubin de $\mathcal{F}$, $NS^q(\tilde{X}, \mathcal{F}) := NS(H_2^q(\tilde{X}, \mathcal{F})) \in NS_d$

6 Théorème d'indice L_2 d' Atiyah

Cette section utilise certaines idées de la preuve de Forster-Knorr du théorème de cohérence de Grauert, voir [16] pp.188-207 pour justifier une suite spectrale de Leray-Serre en cohomologie L_2 , qui est l'outil principal pour la formule de Riemann-Roch.

6.1 Suite spectrale de Leray

Systèmes de faisceaux relatifs à un recouvrement Soit X un espace topologique et $\mathfrak{U} = (U_i)_{i \in A}$ un recouvrement ouvert fini de X . On peut construire la catégorie abélienne $SMod(\mathfrak{U})$ suivante:

Les objets sont des données de la forme $(\mathcal{F}_\alpha, \rho_\alpha^\alpha)_{\alpha, \alpha' \in PF(A)}$, tels que

- $\mathcal{F}_\alpha$ est un faisceau en groupes abéliens sur U_α
- $\rho_\alpha^{\alpha'} : \mathcal{F}_\alpha|_{\tilde{U}_{\alpha'}} \rightarrow \mathcal{F}_{\alpha'}$ est un morphisme défini dès que $\alpha \subset \alpha'$
- Ces données vérifient la condition de cocycle $\rho_\alpha^{\alpha'} \rho_{\alpha'}^{\alpha''} = \rho_\alpha^{\alpha''}$

Un morphisme $\phi : (\mathcal{F}_\alpha, \rho_\alpha^\alpha) \rightarrow (\mathcal{G}_\alpha, \rho_\alpha^\alpha)$ est une collection $(\phi_\alpha)_{\alpha \in PF(A)}$ de morphismes de faisceaux $\phi_\alpha : \mathcal{F}_\alpha \rightarrow \mathcal{G}_\alpha$ commutant aux morphismes de transition. Les règles de composition sont claires.

Il y a un foncteur naturel $n : Mod(X) \rightarrow SMod(\mathfrak{U})$. Au niveau des objets, il associe au faisceau F le système de faisceaux $(F|_{U_\alpha}, r_\alpha^{\alpha'})$, $r_\alpha^{\alpha'}$ étant l'application de restriction. Ce foncteur identifie $Mod(X)$ à une sous catégorie pleine de $SMod(\mathfrak{U})$.

Soit U un ouvert de X , on note par I^U l'inclusion de U dans X . Soit $\Phi = (\mathcal{F}_\alpha, \rho_{\alpha'}^\alpha)_{\alpha, \alpha' \in PF(A)}$ un objet de $SMod(\mathfrak{U})$. On définit un complexe de faisceaux sur $\tilde{X}$, en définissant les cochaines par la formule:

$$K^n(\mathfrak{U}, F) = \bigoplus_{\alpha \in PF(A), |\alpha|=n+1} i_*^{U_\alpha} F_\alpha$$

et la différentielle par la formule de Čech.

Si F est un faisceau abélien, tel qu'il existe une base d'ouverts U pour lesquels la restriction de F à $U \cap U_\alpha$ est un faisceau acyclique dès que $\alpha \in PF(A)$ est une partie non vide, le morphisme naturel $F \rightarrow K^\bullet(\mathfrak{U}, n(F))$ est un quasi isomorphisme.

Plus généralement, si $F^\bullet$ est un complexe de tels faisceaux, on a aussi un quasi isomorphisme $F^\bullet \rightarrow K^\bullet(\mathfrak{U}, n(F^\bullet))$ ¹⁵.

Si $A \subset Mod(X)$ est une sous catégorie de la catégorie des faisceaux en groupes abéliens on peut définir la catégorie SA construite comme ci dessus en demandant que objets et morphismes soient dans A . Par exemple si $A = C_{\bar{\Gamma}, X}(\tilde{X})$, on a la catégorie $SC_{\bar{\Gamma}, X}(\mathfrak{U})$.

Extension de $l^2\pi_*$ à une catégorie dérivée convenable Soit $\tilde{X}$ un Γ -espace complexe et soit $\pi : \tilde{X} \rightarrow X$. Nous supposons de plus que X possède un recouvrement fini $\tilde{\mathfrak{U}}$ par des ouverts Γ -Stein assez petits¹⁶.

$SC_{\bar{\Gamma}, X}(\mathfrak{U})$ contient une sous catégorie pleine S naturellement équivalente à $C_{\bar{\Gamma}, X}(\tilde{X})$.

Nous allons étendre le foncteur $l^2\pi_*$ à $C^i(SC_{\bar{\Gamma}, X}(\mathfrak{U}))$.

Soit $\tilde{j} : \tilde{V} \subset \tilde{X}$ un plongement ouvert. Soit $\mathcal{F} \in C_{\bar{\Gamma}, X}(\tilde{V})$. Considérons le faisceau $\tilde{j}_*\mathcal{F}$. On peut alors poser:

$$l^2\pi_*\tilde{j}_*\mathcal{F} = j_*l^2\pi_*\mathcal{F}$$

À $\mathcal{F}^\bullet$ un objet de $C^i(SC_{\bar{\Gamma}, X}(\mathfrak{U}))$, on associe par ce procédé le complexe $l^2\pi_*K^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F}^\bullet)$, qui est un objet de $C^i(Mod_{W^*(\bar{\Gamma}, X)}(X))$. Cet assignement est sous-jacent à un foncteur. On a, de plus, la:

Proposition 6.1.1 *Le foncteur $l^2\pi_* : C_{\bar{\Gamma}, X}(\tilde{X}) \rightarrow Mod_{W^*(\bar{\Gamma}, X)}(X)$ se prolonge à un foncteur exact $D^iSC_{\bar{\Gamma}, X}(\mathfrak{U}) \rightarrow D^iMod_{W^*(\bar{\Gamma}, X)}(X)$.*

La preuve du théorème 4.4.14 implique aussi la:

Proposition 6.1.2 *Le foncteur $R\Gamma \circ l^2\pi_*$ s'étend à un foncteur triangulé $D_{C_{\bar{\Gamma}, X}(\tilde{X})}^i S_{\bar{\Gamma}, X}(\mathfrak{U}) \rightarrow D^i E_f(W^*(\bar{\Gamma}, X))$*

¹⁵ Précisons que $K^\bullet(\mathfrak{U}, n(F^\bullet))$ est le complexe associé au bicomplexe que la construction précédente fabrique.

¹⁶ Un ouvert Γ -Stein $\tilde{U}$ est *assez petit* s'il existe un autre ouvert Γ -Stein $\tilde{V}$ tel que $\Gamma \backslash \tilde{U} \subset \subset \Gamma \backslash \tilde{V}$.

Théorème de l'image directe de Grauert Il résulte de la preuve de Forster-Knorr du théorème de l'image directe de Grauert (cf. [16] ch. 10.4), que, $\tilde{f} : \tilde{Y} \rightarrow \tilde{X}$ désignant un morphisme propre Γ -équivariant, $\mathcal{G}^\bullet$ un complexe borné de $C_{\tilde{\Gamma}, \chi}(\tilde{Y})$, et $\mathfrak{V}$ un recouvrement fini de $\tilde{Y}$ par des ouverts Γ -Stein assez petits, le complexe de Čech relatif $\tilde{f}_* C^\bullet(\mathfrak{V}, \mathcal{G}^\bullet)$ a la propriété G suivante:

Définition 6.1.3 Soit $F^\bullet$ un complexe borné de $Mod_{\tilde{\Gamma}, \chi}(\tilde{X})$. On dit que $F^\bullet$ a la propriété G si, pour $\tilde{U} \subset \tilde{X}$ un ouvert Γ -Stein assez petit, on peut trouver un complexe borné $\mathcal{F}^\bullet$ dans $C_{\tilde{\Gamma}, \chi}(\tilde{U})$ et un morphisme de complexes $\mathcal{F}^\bullet \rightarrow F^\bullet|_{\tilde{U}}$ induisant un isomorphisme en cohomologie.

Soit $F^\bullet$ un complexe de faisceaux vérifiant la propriété G. La technique de [16], 10.4 pp.202-204, permet de construire un objet de $C^i(SC_{\tilde{\Gamma}, \chi}(\mathfrak{U}))$ ($\mathcal{F}_\alpha^\bullet, \rho_\alpha^{\alpha'}$) et pour $\alpha \in PF(A)$ des morphismes de complexes, induisant des isomorphismes en cohomologie et faisant commuter le diagramme:

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}_{\alpha'}^\bullet|_{\tilde{U}_\alpha} & \rightarrow & \mathcal{F}_\alpha^\bullet \\ \downarrow & & \downarrow \\ F^\bullet|_{\tilde{U}_\alpha} & \xrightarrow{id} & F^\bullet|_{\tilde{U}_\alpha} \end{array}$$

Cette donnée est en fait un quasi isomorphisme dans $C^i(SMod_{\tilde{\Gamma}, \chi}(\mathfrak{U}))$: $\mathcal{F}^\bullet \rightarrow n(F^\bullet)$.

Ceci donne lieu à un quasi isomorphisme

$$K^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F}^\bullet) \rightarrow K^\bullet(\mathfrak{U}, F^\bullet)$$

Appliquant ces considérations à $F^\bullet = \tilde{f}_* C^\bullet(\mathfrak{V}, \mathcal{G}^\bullet)$, on prouve:

Lemme 6.1.4 Soit $i \in \{b, -\}$. Le foncteur dérivé:

$$R\tilde{f}_* : D^i C_{\tilde{\Gamma}, \chi}(\tilde{Y}) \rightarrow D^i_{C_{\tilde{\Gamma}, \chi}(\tilde{X})} Mod_{\tilde{\Gamma}, \chi}(\tilde{X})$$

factorise à un foncteur triangulé

$$R\tilde{f}_* : D^i C_{\tilde{\Gamma}, \chi}(\tilde{Y}) \rightarrow D^i_{C_{\tilde{\Gamma}, \chi}(\tilde{X})} SC_{\tilde{\Gamma}, \chi}(\mathfrak{U})$$

Un intérêt de ce lemme est qu'il permet de définir $l^2 \pi_* R\tilde{f}_* \mathcal{G}^\bullet$, $\mathcal{G}^\bullet$ étant un objet de $D^i C_{\tilde{\Gamma}, \chi}(\tilde{Y})$. Il permet aussi de formuler la:

Proposition 6.1.5 Soit $\tilde{f} : \tilde{Y} \rightarrow \tilde{X}$ un morphisme propre équivariant, alors $R\tilde{f}_* \circ l^2 \pi_* = l^2 \pi_* \circ R\tilde{f}_*$.

Preuve : Soit $\mathcal{G}^\bullet$ un complexe borné (resp. borné supérieurement) de $C_{\Gamma, \chi}(\tilde{Y})$. Soit un quasi isomorphisme $\mathcal{F}^\bullet \rightarrow n(f_* C^\bullet(\mathfrak{V}, \mathcal{G}^\bullet))$ avec $\mathcal{F}^\bullet$ un objet de $SC_{\Gamma, \chi}(\mathfrak{U})$.

On a le diagramme suivant de morphismes de complexes de faisceaux:

$$\begin{array}{ccc} l^2 \pi_* K^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F}^\bullet) & & K^\bullet(\pi(\mathfrak{U}), f_* C^\bullet(\mathfrak{V}, l^2 \pi_* \mathcal{G}^\bullet)) \\ i_1 \downarrow & & i_2 \downarrow \\ \pi_* K^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F}^\bullet) & \xrightarrow{q} & \pi_* K^\bullet(\mathfrak{U}, f_* C^\bullet(\mathfrak{V}, \mathcal{G}^\bullet)) = K^\bullet(\pi(\mathfrak{U}), f_* C^\bullet(\mathfrak{V}, \pi_* \mathcal{G}^\bullet)) \end{array}$$

i_1, i_2 sont des inclusions et q un quasi isomorphisme. Comme:

$$\begin{aligned} l^2 \pi_* R\tilde{f}_* \mathcal{G}^\bullet &= l^2 \pi_* K^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F}^\bullet) \\ Rf_* l^2 \pi_* \mathcal{G}^\bullet &= K^\bullet(\pi(\mathfrak{U}), f_* C^\bullet(\mathfrak{V}, l^2 \pi_* \mathcal{G}^\bullet)) \end{aligned}$$

6.1.5 résultat du lemme:

Lemme 6.1.6 *L'image de $q \circ i_1$ est contenue dans celle de i_2 et le morphisme de complexes de faisceaux résultant*

$$l^2 \pi_* K^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F}^\bullet) \rightarrow K^\bullet(\pi(\mathfrak{U}), f_* C^\bullet(\mathfrak{V}, l^2 \pi_* \mathcal{G}^\bullet))$$

est un quasi isomorphisme.

Preuve : Cette question est de nature locale. Par suite, il suffit de traiter le cas où $\tilde{X}$ est Γ -Stein et où il existe un quasi isomorphisme global $\mathcal{F}^\bullet \rightarrow \tilde{f}_* C^\bullet(\mathfrak{V}, \mathcal{G}^\bullet)$. On est alors ramené au cas où $\mathfrak{U}$ est le recouvrement trivial $\{\tilde{X}\}$. Redécrivons la situation:

On a des inclusions (au sens naïf) $l^2 \pi_* \mathcal{F}^\bullet \rightarrow \pi_* \mathcal{F}^\bullet, \pi_* \mathcal{F}^\bullet \rightarrow \pi_* \tilde{f}_* C^\bullet(\mathfrak{V}, \mathcal{G}^\bullet)$.

On a également une égalité:

$$\pi_* \tilde{f}_* C^\bullet(\mathfrak{V}, \mathcal{G}^\bullet) = f_* \pi_* C^\bullet(\mathfrak{V}, \mathcal{G}^\bullet) = f_* C^\bullet(\mathfrak{V}, \pi_* \mathcal{G}^\bullet)$$

D'où deux inclusions:

$$l^2 \pi_* \mathcal{F}^\bullet \rightarrow f_* C^\bullet(\mathfrak{V}, \pi_* \mathcal{G}^\bullet) \leftarrow f_* C^\bullet(\mathfrak{V}, l^2 \pi_* \mathcal{G}^\bullet)$$

Il s'agit de montrer qu'en fait:

$$l^2 \pi_* \mathcal{F}^\bullet \subset f_* C^\bullet(\mathfrak{V}, l^2 \pi_* \mathcal{G}^\bullet)$$

et que cette inclusion est un quasi isomorphisme.

Le problème étant de nature locale il sera suffisant de montrer que, après application du foncteur des sections globales sur $X = \Gamma \backslash \tilde{X}$

$$A_2^\bullet = \Gamma(X, l^2 \pi_* \mathcal{F}^\bullet) \subset B_2^\bullet = \Gamma(X, f_* C^\bullet(\mathfrak{V}, l^2 \pi_* \mathcal{G}^\bullet))$$

et que cette inclusion est un quasi isomorphisme.

Posons $\tilde{X} = \Gamma X^0$ avec X^0 une réunion fine de composantes connexes Stein de groupe d'isotropie Σ fini. Posons $Y^0 = \tilde{f}^{-1}(X^0)$ et désignons par $\mathfrak{V}^0$ le recouvrement induit par $\mathfrak{V}$.

Il y a un morphisme de complexes en espaces de Fréchet:

$$A^\bullet = \Gamma(X^0, \mathcal{F}^\bullet) \rightarrow B^\bullet = \Gamma(X^0, \tilde{f}_* C^\bullet(\mathfrak{V}^0, \mathcal{G}^\bullet))$$

Ce morphisme est un quasi isomorphisme puisque les deux complexes ont pour cohomologie $\Gamma(X^0, R^\bullet \tilde{f}_* \mathcal{G}^\bullet)$. De plus, ces complexes en espaces de Fréchet sont stricts¹⁷ et la structure de Fréchet induite sur leur cohomologie est préservée par ce quasi isomorphisme puisqu'il est continu (preuve laissée au lecteur) et coïncide avec la structure de Fréchet canonique sur $\Gamma(X^0, R^\bullet \tilde{f}_* \mathcal{G}^\bullet)$.

Les structures de Fréchet de $\Gamma(X^0, R^\bullet \tilde{f}_* \mathcal{G}^\bullet)$ et des espaces de cochaines de $A^\bullet$ (resp. de $B^\bullet$) peuvent se laisser décrire par des familles dénombrables de semi normes $\{\|\cdot\|_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ de façon que toutes les morphismes introduits ci dessus soient continus en norme $\|\cdot\|_n$.

Soit $q \in \mathbb{Z}$. L'espace A_2^q est par définition isomorphe à l'espace des suites $(a_\gamma^q)_{\gamma \in \Gamma/\Sigma}$ avec $a_\gamma^q \in A^q$ telles que pour tout n , $\sum_\gamma \|a_\gamma^q\|_n^2 < \infty$. Comme il y a une description similaire pour B_2^q , l'inclusion $A_2^\bullet \subset B_2^\bullet$ résulte de la continuité de l'inclusion $A^\bullet \rightarrow B^\bullet$.

$A^\bullet$ étant strict, appliquant le théorème de l'application ouverte pour les espaces de Fréchet à la surjection d'espaces de Fréchet $d : A^{q-1} \rightarrow dA^{q-1}$, on déduit le complexe $A_2^\bullet$ est strict et que sa cohomologie se laisse décrire comme l'espace des suites $(h_\gamma^q)_{\gamma \in \Gamma/\Sigma}$ avec $h_\gamma^q \in H^q(A^\bullet)$ telles que pour tout n , $\sum_\gamma \|h_\gamma^q\|_n^2 < \infty$. La même description valant pour $B_2^\bullet$, il suit que l'inclusion $A_2^\bullet \subset B_2^\bullet$ est un quasi isomorphisme. $\square$

Suite spectrale de Leray

Proposition 6.1.7 *Soit $\tilde{X}$ un Γ -espace complexe. Soit $\mathcal{F} \in C_{\bar{\Gamma}, \chi}(\tilde{X})$. Soit $\tilde{f} : \tilde{Y} \rightarrow \tilde{X}$ un morphisme propre équivariant.*

Il existe une suite spectrale de premier cadran $(E_r^{s,t}, d_r)_{r \geq 0}$ dans $\text{Mod}_{W^(\bar{\Gamma}, \chi)}$ aboutissant à $H_{(2)}^*(\tilde{Y}, \mathcal{F})$ et de terme $E_2^{r,s} = H_{(2)}^r(\tilde{X}, R^s f_* \mathcal{F})$.*

Si $\tilde{X}$ est cocompact, la suite spectrale $(E_r^{s,t}, d_r)_{r \geq 0}$ peut être obtenue dès le terme $E_2^{r,s}$ à partir d'une suite spectrale dans $E_f(W^(\bar{\Gamma}, \chi))$ par application du foncteur d'oubli 4.3.6.*

¹⁷ C'est à dire tels que l'image de la différentielle est fermée.

Preuve: La suite spectrale de Leray pour l'application continue $f : Y \rightarrow X$ et le faisceau $l^2\pi_*\mathcal{F}$ a pour terme E_2

$$E_2^{r,s} = H^r(X, R^s f_* l^2\pi_*\mathcal{F})$$

que 6.1.5 identifie canoniquement à $H^r(X, l^2\pi_* R^s \tilde{f}_*\mathcal{F})$. D'où le premier point. Le deuxième point est laissé au lecteur (il s'agit d'une adaptation facile de la preuve du théorème 5.3.8). $\square$

Corollaire 6.1.8 *Soit $\tilde{X}$ un Γ -espace complexe cocompact. Soit $\mathcal{F} \in C_{\Gamma,X}(\tilde{X})$. Soit $\tilde{f} : \tilde{Y} \rightarrow \tilde{X}$ un morphisme propre équivariant.*

$$\sum_n (-1)^n \dim_{\bar{\Gamma}} H_2^n(\tilde{Y}, \mathcal{F}) = \sum_{r,s} (-1)^{r+s} \dim_{\bar{\Gamma}} H_2^r(\tilde{Y}, R^s \tilde{f}_*\mathcal{F})$$

6.2 Formules de Riemann-Roch par désingularisation

Le théorème de résolution des singularités de Hironaka [26] permet de ramener le calcul de la caractéristique d'Euler d'un faisceau analytique cohérent sur un espace complexe au calcul de la caractéristique d'Euler de plusieurs faisceaux localement libres sur des variétés complexes via la suite spectrale de Leray. Dans cet esprit, nous obtenons le:

Théoreme 6.2.1 *Soit $\mathcal{F}$ un faisceau analytique cohérent sur l'espace complexe compact X . Soit $\pi : \tilde{X} \rightarrow X$ un revêtement galoisien de groupe Γ .*

$$\sum_n (-1)^n h_2^n(\tilde{X}, \pi^*\mathcal{F}) = \sum_n (-1)^n h^n(X, \mathcal{F})$$

Preuve: Par récurrence sur $\dim(X)$. En dimension 0, ceci résulte des propriétés ordinaires de la dimension de Von Neumann. Utilisant la filtration I -adique (I désigne le radical de X), on se ramène au cas où X est réduit. On peut supposer que le support du faisceau $\mathcal{F}$ est X , sinon l'utilisation de 6.1.8 pour l'inclusion dans $\tilde{X}$ du Γ -espace complexe défini par l'idéal annulateur de $\mathcal{F}$ permet de conclure. Utilisant 6.1.8 pour une désingularisation équivariante ϕ , on peut se ramener au cas où X est lisse puisque, pour $q \geq 1$ $R^q \phi_* \phi^* \mathcal{F}$ est supporté en dimension $< \dim(X)$ et qu'on a une suite exacte $0 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \phi_* \phi^* \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{N} \rightarrow 0$, $\mathcal{N}$ étant supporté en dimension $< \dim(X)$. De même, utilisant la suite exacte $0 \rightarrow \mathcal{T} \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{K} \rightarrow 0$ où $\mathcal{T}$ est le sous-faisceau de torsion maximal, on se ramène au cas où $\mathcal{F}$ est sans torsion sur la variété lisse X . On peut trouver $f : \hat{X} \rightarrow X$ un éclatement équivariant de X tel que $\mathcal{V} = f^{-1}\mathcal{F}.O_{\hat{X}}$ est localement libre et $\hat{X}$ est lisse. Le conoyau de l'injection canonique $\mathcal{F} \rightarrow f_*\mathcal{V}$ et les $R^q f_*\mathcal{V}$ sont supportés en dimension $< \dim(X)$, ce qui ramène au cas d'un faisceau localement libre sur une variété, traité par [2]. $\square$

Le principe de dévissage 6.1.8 permet en principe de mener à bien le calcul de la caractéristique d'Euler L^2 d'un faisceau analytique cohérent projectivement périodique sur un Γ -espace complexe propre cocompact en se ramenant au théorème d'indice L_2 d'Atiyah [2], éventuellement sous la forme plus générale utilisée sous l'appellation 'Vafa-Witten twisting trick' dans [20] (voir [9], pp. 189-196 pour une exégèse).

Une suite spectrale de Leray en cohomologie L_p existe très probablement et permet également de ramener l'étude de la classe de K -théorie associée à la somme alternée des cohomologies L_p d'un faisceau analytique cohérent périodique général au cas d'un fibré sur une base lisse. La plus petite catégorie abélienne dans laquelle vit la cohomologie L_p avec $p \neq 2$ étant loin d'être aussi bien comprise que $E_f(W_r^*(\Gamma))$, nous ne poursuivrons pas plus loin cette voie puisqu'elle ne paraît pas pouvoir amener des applications substantielles.

References

- [1] D. Arapura, P. Bressler, M. Ramachandran *On the fundamental group of a compact Kähler manifold*, Duke Math. Journal **68** (1992) 477-488
- [2] M. Atiyah *Elliptic operators, discrete groups and Von Neumann algebras* Soc. Math.Fr. Asterisque **32-33**, 1976, 43-72
- [3] F. Campana *Remarques sur le revêtement universel des variétés kähleriennes*, Bull. Soc. Math. Fr. **122** (1994), 255-284
- [4] F. Campana *Fundamental group and positivity of cotangent bundles of compact Kähler manifolds*, J. Alg. Geo. **4** (1995), 487-502.
- [5] F. Campana et J.P. Demailly Communication personnelle
- [6] J. Cheeger, M. Gromov, *L_2 -cohomology and group cohomology*, Topology **25** (1986), 189-215
- [7] J.P. Demailly *L^2 vanishing theorems for Positive Line Bundles and Adjunction Theory*, in *Transcendental Methods in Algebraic Geometry*, édité par F. Catanese et C. Ciliberto, LNM **1646** (1996), Springer
- [8] J. Dodziuk *De Rham-Hodge theory for L^2 -cohomology of infinite coverings*, Topology **16** (1977), 157-165
- [9] P. Eyssidieux *La caractéristique d'Euler du complexe de Gauss-Manin*, Journal für die reine und angewandte Mathematik **490** (1997) 155-212
- [10] P. Eyssidieux *Théorie de l'adjonction L_2 sur le revêtement universel*, Prépublication 96 du Laboratoire Emile Picard, mai 1997.

- [11] P. Eyssidieux *Systèmes linéaires adjoints L_2* , manuscrit soumis pour publication
- [12] M.S. Farber *Homological algebra of Novikov-Shubin invariants and Morse inequalities*, GAFA, Vol. **6**, n° **4**, 1996
- [13] M.S. Farber *Von Neumann Categories and extended L^2 cohomology*, Prépublication IHES/M/96/66, 1996
- [14] O. Forster et K. Knorr *Ein Beweis des Grauertschen Bildgarbensatzes nach Ideen von B. Malgrange*, Manuscripta Math. **5** (1971), 19-44
- [15] P. Freyd *Abelian Categories*, Harper and Row, 1964
- [16] H. Grauert et R. Remmert *Coherent Analytic Sheaves*, Grundlehren der mathematischen Wissenschaften, **265**, Springer, 1984
- [17] H. Grauert et R. Remmert *Komplexe Räume*, Math. Annalen **136**, 245-318 (1958).
- [18] P. Griffiths, J. Harris *Principles of Algebraic Geometry*, John Wiley and Sons, 1978
- [19] M. Gromov *Sur le groupe fondamental d'une variété kählérienne*, C.R. Acad. Sci. Paris **308** Série 1 (1989), 67-70
- [20] M. Gromov, *Kähler hyperbolicity and L^2 -Hodge theory*, J. Diff. Geom. **33**, 1991, 263-291
- [21] M.Gromov, G.Henkin, M.Shubin *L^2 holomorphic functions on pseudoconvex coverings*, Prépublication de l'IHES, IHES/M/95/58
- [22] M.Gromov, M.Shubin *Von Neumann spectra near zero*, GAFA **1** (1991), 375-404
- [23] M.Gromov, M.Shubin *Near-cohomology of Hilbert complexes and topology of non-simply connected manifolds*, Astérisque **210** (1992), 283-294
- [24] R. Hartshorne *Algebraic Geometry*, GTM **52** (1997), Springer
- [25] R. Hartshorne *Residues and duality, Lecture Notes in Math* **20**, Springer, (1966)
- [26] H. Hironaka *Résolution of singularities over a field of characteristic zero*, Ann. of Math., **79** (1964), 109-326

- [27] J. Jost et K. Zuo *Vanishing theorems for L^2 -cohomology on infinite coverings of Compact Kähler manifolds and applications in algebraic geometry*, Communication personnelle, Jan. 21, 1997.
- [28] Kollár J. *Shafarevich maps and plurigenera of algebraic varieties*, Inv. Math.**113** (1993), 177-215
- [29] Kollár J. *Shafarevich maps and Automorphic Forms*, Princeton University Press (1995).
- [30] S. Lang *Algebra*, Addison-Wesley, 2nd edition (1984)
- [31] J. Lott et W. Lück *L^2 -topological invariants of 3-manifolds*, Inv. Math **120**, 1995, 15-60
- [32] W. Lück *Approximating L^2 -invariants by their finite dimensionnal counterparts*, GAFA **4**, 1994, 455-481
- [33] W. Lück *Hilbert modules and modules over finite Von Neumann algebras and applications to L^2 invariants*, Prépublication (1996)
- [34] T. Napier et M. Ramachandran *Structure theorems for complete Kähler manifolds and applications to Lefschetz type theorems*, GAFA **5** (1995), 809-851
- [35] S. Novikov et M.Shubin *Morse inequalities and Von Neumann invariants of non simply connected manifolds*, Sov. Math. Dok. **34** (1987), 79-82
- [36] S. Novikov et M.Shubin, *Morse inequalities and Von Neumann II_1 factors*, Dokl. Akad. Nauk. **34** no. **1** (1986), 289-292
- [37] Takayama S. *Nonvanishing Theorems on an algebraic Variety with large fundamental group*, Prépublication, Naruto University of Education, (1997)
- [38] J.L. Verdier *Catégories dérivées, état 0*, LNM **569** (1977), Springer.
- [39] K. Yosida *Functionnal Analysis*, Grundlehren der mathematischen Wissenschaften, **123**, 6^{ième} édition, Springer, 1980

Philippe Eyssidieux,
 Laboratoire Emile Picard, CNRS UMR 5580, UFR MIG
 Université Paul Sabatier, 118 route de Narbonne
 31062 Toulouse Cedex 4, France
 e-mail: eyssi@picard.ups-tlse.fr